



## 農薬の影響について

農薬散布時には必ずハチを回収しハウス外に移動します。影響表を参考に残効が切れてから、ハウス内に再導入してください。

### ■マルハナバチへの農薬影響表

殺虫・殺ダニ剤		殺虫・殺ダニ剤		殺菌剤	
商品名	影響日数	商品名	影響日数	商品名	影響日数
アーデント	3	ダブルフェース	1	アフエット	1
アカリタッチ	0	ダントツ(粒)	21	アミスター	1
アクタラ(粒)	21	ダントツ(水)	15以上	アリエッティ	2
アクタラ(水)	42	チェス	0	アントラコール	1
アクテリック	14	テルスター	30	イオウフロアブル	0
アグリメック	7	ディアナ	1~3	オーソサイド	0
アグロスリン	20以上	トリガード	1	オルパ	0
アタブロン	4	トルネード	6	カスミン	0
アディオ	20以上	トレボン	20以上	ガッテン	0
アドバンテージ(粒)	21	ネマキック	14以上	カリグリーン	0
アドマイヤー(粒)	35以上	ネマトリン	14以上	カンタス	0
アドマイヤー(水)	30以上	ニツラン	1	クムラス	0
アニキ	1	ノーモルト	1	ゲッター	0
アフアーム	2	ハチハチ	5以上	サブロール	0
アフアームエクセラ	2	バイデント(粒)	14	サンヨール	0
アブロード	1	パイレーツ	0	ジーファイン	0
アブロードエース	1	バリアード	1	ジマンダイセン	0
アルバリン/スタークル(粒)	10以上	BT剤(ジャックポットなど)	1	ジャストミート	0
アルバリン/スタークル(水)	14以上	ピラニカ	1	ストロビー	0
ウララ	0	ファルコン	1	スミレックス	0
オルトラン(水)	10~20	フェニックス	1	セイビアー	0
オルトラン(粒)	14~30	プレオフロアブル	1	ダコニール	0
オレート	1	プレバゾン	1	銅剤	0
カウンター	1	プリファード	0	トップジンM	0
カスケード	2	プリロソ	1	トリフミン	1
カネマイト	2	ベストガード(水)	10以上	バチスター	0
気門封鎖剤(キモンブロックなど)	0	ベストガード(粒)	30以上	ファンタジスタ	0
クリアザール	1	ベネビア	1	ファンベル	1
コテツ	9	ベリマーク	1	ブリザード	1
コルト	3~7	ボタニガード(ES、水)	1	フルピカ	0
コロマイト	1	マイコタール	1	プロパティ	0
サイハロン	4	マイトコーネ	1	ベルコート	0
サンクリスタル	1	マッチ	0	ベンレート	0
ジメトエート	20以上	マトリック	1	ポリオキシシンAL	0
スカウト	2	マブリック	2~3	ホライズン	0
スターマイト	1	マラソン	30	ピクシオ	0
スピノエース	3~7	モスピラン	1~3	モレスタン	3~5
スプラサイド(水)	30			ライメイ	1
スミチオン	20以上	ラグビーMC(粒)	30以上	ランマン	0
ダイアジノン	30	ラノー	0	レーバス	1
ダニサラバ	1	ロディー	14以上	ルビゲン	0
ダニトロン	1			ロブラール	0

影響日数に“以上”という表記がある剤は、農薬の影響が長期に残る可能性があります。

注) 農薬散布する時は、散布前にマルハナバチを巣箱に回収し、別の場所で保管してください。

再放飼する時は、影響日数をあけて行ってください。影響0日の薬剤は、薬液が乾燥してから行ってください。

表中の影響日数はあくまで目安であり、濃度、散布量、環境条件、気象条件等によっても異なります。

上記の理由により、この表が原因で事故が発生しても、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

※この表は、日本生物防除協議会、農薬メーカー、試験研究所などの情報を基に弊社の知見を加え作成しています。