

マルハナバチへの農薬影響表（クロマルハナバチ、セイヨウオオマルハナバチ共通）

（2018年8月改定）

殺虫・殺ダニ剤	
商 品 名	影響日数
アーデント	3
アクセル	8
アカリタッチ	0
アクタラ（粒）	21
アクタラ（水）	42
アクテリック	14
アクセルフロアブル	8
アグリメック	7～14
アグロスリン	20以上
アタブロン	4
アディオオン	20以上
アドバンテージ（粒）	21
アドマイヤー（粒）	35以上
アドマイヤー（水）	30以上
アニキ	1
アフーム	2
アフームエクセラ	2
アブロード	1
アブロードエース	1
アルバリン/スタークル（粒）	10以上
アルバリン/スタークル（水）	14以上
ウララ	0
オルトラン（粒）	14～30
オルトラン（水）	10～20
オレート	1
カウンター	1
カスケード	2
カネマイト	2
気門封鎖剤（特ノブロックなど）	0
クリアザール	1
コデツ	9
コルト	3～7
コロマイト	1
サイハロン	4
サンクリスタル	1
スカウト	2
スターマイト	1
スピノエース	3～7
スプラサイド（水）	30
スミチオン	20以上
ダイアジノン	30
ダニサラバ	1
ダニトロン	1
ダブルシューター	3
ダブルフェース	1
ダントツ（粒）	21
ダントツ（水）	15以上

殺虫・殺ダニ剤	
商 品 名	影響日数
チェス	0
ディアナ	1～3
テルスター	30
トランスフォーム	2～5
トリガード	1
トルネード	6
トレボン	20以上
ニッソラン	1
ネマキック	14以上
ネマトリン	14以上
ノーモルト	1
バイデート(粒)	14
バリアード	1
BT剤（ジャックポットなど）	1
ピラニカ	1
ファインセーブ	1
ファルコン	1
フェニックス	1
ブレオフロアブル	1
プレバソン	1
プリファード	0
ブリロッソ	1
ベストガード（水）	10以上
ベストガード（粒）	30以上
ベネビア	1
ベリマーク	1
パルミノ（モレスタン）	3～5
ボタニガード（ES、水）	1
マイコタール	1
マイトコーネ	1
マッチ	0
マトリック	1
マブリック	2～3
マラソン	30
ミネクトデュオ	14～21
モスピラン	1～3
モベント	45以上
ラグビーMC（粒）	30以上
ラノー	0
ロディー	14以上

殺菌剤	
商 品 名	影響日数
アフエット	1
アミスター	1
アリエッティ	2
アントラコール	1
イオウフロアブル	0
オーソサイド	0
オルパ	0
カスミン	0
ガッテン/ショウチノスケ	0
カリグリーン	0
カンタス	0
クムラス	0
ゲッター	0
サブロール	0
サンヨール	0
ジーファイン	0
ジマンダイセン	0
ジャストミート	0
スクレア	1
ストロビー	0
スミレックス	0
セイビアー	0
ダコニール	0
銅剤	0
トップジンM	0
トリフミン	1
ネクスター	1
パレード	1
パチスター	0
ピクシオ	0
ピシロック	0
ファンタジスタ	0
ファンベル	1
ブリザード	1
フルピカ	0
プロパティ	0
ベジセイバー	-
ベルコート	0
ベンレート	0
ホライズン	0
ポリオキシシAL	0
モレスタン	3～5
ライメイ	1
ランマン	0
ルビゲン	0
レーバス	1
ロブラール	0

注）農薬散布する時は、散布前にマルハナバチを巣箱に回収し、別の場所で保管して下さい。

再放飼する時は、影響日数をあけて行って下さい。影響0日の薬剤は、薬液が乾燥してから行って下さい。

表中の影響日数はあくまで目安であり、濃度、散布量、環境条件、気象条件等によっても異なります。

※この表は、日本生物防除協議会、農薬メーカー、試験研究所などの情報を基にアリスタライフサイエンス（株）の知見を加え作成しています。