

マルハナバチへの農薬影響表

殺虫・殺ダニ剤	
商品名	影響日数
アーデント	3
アカリタッチ	0
アクタラ (粒)	21
アクタラ (水)	42
アクテリック	14
アグリメック	7
アグロスリン	20以上
アタブロン	4
アディオン	20以上
アドバンテージ (粒)	21
アドマイヤー (粒)	35以上
アドマイヤー (水)	30以上
アニキ	1
アフーム	2
アフームエクセラ	2
アブロード	1
アブロードエース	1
アルバリン/スタークル (粒)	10以上
アルバリン/スタークル (水)	14以上
ウララ	0
オルトラン (水)	10~20
オルトラン (粒)	14~30
オレート	1
カウンター	1
カスケード	2
カネマイト	2
気門封鎖剤 (キエンブロックなど)	0
クリアザール	1
コテツ	9
コルト	3~7
コロマイト	1
サイハロン	4
サンクリスタル	1
サンマイト	1~4
ジメトエート	20以上
スカウト	2
スターマイト	1
スピノエース	3~7
スプラサイド (水)	30
スミチオン	20以上
ダイアジノン	30
ダニサラバ	1

殺虫・殺ダニ剤	
商品名	影響日数
ダニトロン	1
ダブルフェース	1
ダントツ (粒)	21
ダントツ (水)	15以上
チェス	0
テルスター	30
ディアナ	1~3
トリガード	1
トルネード	6
トレボン	20以上
ネマキック	14以上
ネマトリン	14以上
ニッソラン	1
ノーモルト	1
ハチハチ	5以上
バイデート(粒)	14
パイレーツ	0
バリアード	1
BT剤 (ジャックポットなど)	1
ピラニカ	1
ファルコン	1
フェニックス	1
プレオフロアブル	1
プレバソン	1
プリファード	0
プリロツソ	1
ベストガード (水)	10以上
ベストガード (粒)	30以上
ベネビア	1
ベリマーク	1
ポタニガード (ES、水)	1
マイコタール	1
マイトコーネ	1
マッチ	0
マトリック	1
マブリック	2~3
マラソン	30
モスピラン	1~3
モベント	45
ラグビーMC (粒)	30以上
ラノー	0
ロディー	14以上

殺菌剤	
商品名	影響日数
アフエット	1
アミスター	1
アリエッティ	2
アントラコール	1
イオウフロアブル	0
オーソサイド	0
オルパ	0
カスミン	0
ガッテン	0
カリグリーン	0
カンタス	0
クムラス	0
ゲッター	0
サブロール	0
サンヨール	0
ジーファイン	0
ジマンダイセン	0
ジャストミート	0
ストロビー	0
スミレックス	0
セイビアー	0
ダコニール	0
銅剤	0
トップジンM	0
トリフミン	1
パチスター	0
ファンタジスタ	0
ファンベル	1
ブリザード	1
フルピカ	0
プロパティ	0
ベルコート	0
ベンレート	0
ポリオキシシンAL	0
ホライズン	0
ピクシオ	0
モレスタン	3~5
ライメイ	1
ランマン	0
レーバス	1
ルビゲン	0
ロブラール	0

注) 農薬散布する時は、散布前にマルハナバチを巣箱に回収し、別の場所で保管してください。

再放飼する時は、影響日数をあけて行ってください。影響0日の薬剤は、薬液が乾燥してから行ってください。

表中の影響日数はあくまで目安であり、濃度、散布量、環境条件、気象条件等によっても異なります。

上記の理由により、この表が原因で事故が発生しても、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

※この表は、日本バイオリジカルコントロール協議会、農薬メーカー、試験研究所などの情報を基に弊社の知見を加え作成しています。