

殺虫剤
オルトラン粒剤
(アセフェート粒剤)

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	アオムシ、コナガヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)		
	アザミウマ類	6kg/10a (2g/株)						
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期		散布			
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時		1回		作条散布 又は植穴処理	1回
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ							
ピーマン	アブラムシ類							
はくさい	アオムシ、コナガヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)					植穴処理	
ブロッコリー	ヨトウムシ アザミウマ類	6kg/10a (2g/株)		株元散布				
だいこん	アオムシ、コナガアブラムシ類	3～4kg/10a		は種前		作条散布		

アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゼフェートを含む農薬の総使用回数
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫 21 日前まで	1 回	株元散布	1 回
ごぼう		3~6kg/10a	収穫 75 日前まで			2 回以内
れんこん		4kg/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布 無人航空機による散布	2 回以内
ばれいしょ		3~6kg/10a (1~2g/株)	植付時	1 回	作条散布	3 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内)
えだまめ	ハスモンヨトウ	3~6kg/10a	収穫 21 日前まで	3 回以内	生育期株元散布	3 回以内
なばな	アブラムシ類	6kg/10a	定植時	1 回	植溝土壌混和	1 回
			は種時		播溝土壌混和	
花き類・ 観葉植物	アザミウマ類 アブラムシ類	3~6kg/10a	発生初期	5 回以内	株元散布	5 回以内
宿根スターチス	ヨウムシ類	6kg/10a				
カーネーション	コガネムシ類幼虫					
アリウム	コナガ					
きく	ネキリムシ類 ハモグリハエ類					
つつじ類	ツツジゲンハイ					
たであい	アブラムシ類					
		6kg/10a	株元散布			
いぐさ	イグサシムシガ	4kg/10a	生育期	2 回以内	湛水散布	2 回以内
芝	スジキリヨトウ シバツガ	10kg/10a	発生初期	5 回以内	全面散布	5 回以内
	タマナヤガ	5~10kg/10a				
たばこ	ヨウムシ、ネキリムシ アブラムシ類 アザミウマ類 ジャガイモガ ヤサイゾウムシ	3~6kg/10a	移植前	1 回	作条散布後 土壌混和	2 回以内
	アブラムシ類		本畑初期		株元散布	

アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)