

殺虫剤
トクチオン細粒剤F
 (プロチオホス粉粒剤)

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロチオホスを含む農薬の総使用回数
いちご (仮植床)	コガネムシ類幼虫	6 kg/10a	植付時	1回	全面土壌混和	3回以内 (仮植床植付時の土壌混和は1回以内)
らっかせい	ヒョウタンゾウムシ類	6~9 kg/10a	は種時 生育期 但し収穫60日前まで	2回以内	土壌表面散布後土壌混和	2回以内 (は種時の土壌混和は1回以内)
	ネダニ類	6 kg/10a	定植時	1回	植溝土壌混和	1回
らっきょう	ネダニ類		定植時	1回	植溝土壌混和	1回
ごぼう	ヒョウタンゾウムシ類 ネキリムシ類	6 kg/10a	収穫30日前まで	4回以内	株元散布	4回以内
にら	ネダニ類	6~9 kg/10a	定植時	1回	全面土壌混和 又は 植溝土壌混和	2回以内 (土壌混和は1回以内、 株元灌注は1回以内)
にら(花茎)						1回
さとうきび	ハリガネムシ類	9~15 kg/10a	植付時	2回以内	植溝土壌混和	2回以内 (植付時の土壌混和は1回以内)
	メイチュウ類	15 kg/10a	生育期 但し収穫90日前まで		株元処理 土壌混和	
かんしょ	コガネムシ類幼虫	6~9kg/10a	植付前	1回	植溝又は作条土壌混和	4回以内 (植付前の土壌混和は1回以内、 散布は3回以内)
	ハリガネムシ類	9 kg/10a				
芝			発生初期	5回以内	散布	5回以内
つつじ類	コガネムシ類幼虫	6~12 kg/10a	植付時	3回以内	全面土壌混和	3回以内
		12 kg/10a	生育期 (発生初期)		土壌表面散布後土壌混和	
ひのき	コガネムシ類幼虫	9~12 kg/10a	植付時 又は 生育期 (発生初期)	3回以内	植付時: 全面土壌混和 生育期: 土壌表面散布後土壌混和	3回以内
きく	アザミウマ類	6~12 kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内
れんげ (緑肥用)	アルファルファタコゾウムシ	6 kg/10a	開花前	1回	散布	1回

アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)