

殺菌剤  
**オーソサイド水和剤80**  
 (キャプタン水和剤)

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数											
りんご	黒星病	600～1000倍	200～700ℓ / 10a	収穫14日前まで	6回以内	散布	6回以内											
	黒点病	800～1200倍																
	斑点落葉病 輪紋病、褐斑病 すす点病、すす斑病	600～800倍																
	炭疽病	800倍																
なし	赤星病、黒星病 輪紋病	600～1000倍		収穫3日前まで	9回以内		9回以内											
	疫病	1000倍																
	炭疽病	800倍																
ぶどう	晩腐病、褐斑病、 灰色かび病、べと病、 枝膨病、黒とう病	800倍		収穫45日前まで	2回以内		2回以内											
おうとう	褐色せん孔病 灰星病、炭疽病			収穫14日前まで	5回以内		5回以内											
マルメロ	黒点病	1000倍			6回以内		6回以内											
小粒核果類	黒星病	800～1000倍			3回以内		3回以内											
	すす斑病	800倍																
ブルーベリー	斑点病	500～1000倍	収穫21日前まで	2回以内	5回以内 (生育期は2回以内、 収穫終了後～落葉期まで は3回以内)													
	すす点病 灰色かび病	500倍																
はくさい	黒斑病、白斑病 苗立枯病	600～1200倍	100～300ℓ / 10a	収穫7日前まで	5回以内	6回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は5回以内)												
	べと病	600倍																
トマト	疫病	800～1200倍		収穫前日まで		5回以内	5回以内 (種子粉衣は1回以内)											
	葉かび病 灰色かび病	800倍																
きゅうり	炭疽病、褐斑病	600～800倍		収穫14日前まで				5回以内	5回以内 (種子粉衣は1回以内)									
	べと病	600倍																
すいか	べと病、つる枯病									収穫14日前まで	5回以内	5回以内 (種子粉衣は1回以内)						
メロン	炭疽病	400～800倍																
しろうり	べと病	600倍											収穫前日まで	5回以内	5回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は5回以内)			
	かぼちゃ	炭疽病														400～800倍		
たまねぎ	灰色かび病 白色疫病 苗立枯病	600倍														収穫前日まで	5回以内	5回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は5回以内)
葉たまねぎ																収穫7日前まで		
いちご	灰色かび病 炭疽病、芽枯病	800倍	収穫30日前まで		3回以内											3回以内		
いんげんまめ	炭疽病	600～1200倍	収穫30日前まで		2回以内											3回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は2回以内)		

**アリスタライフサイエンス株式会社**

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数
ゆきやなぎ	苗立枯病	1000 倍	200~700ℓ/	—	8 回以内	散布	8 回以内
せんりょう	炭疽病	600 倍	10a				
芝	葉腐病 (ブラウンパッチ)	300~500 倍	0.5~2 ℓ/m <sup>2</sup>	発病初期	8 回以内	散布	8 回以内
	赤焼病	500~800 倍	1~2 ℓ/m <sup>2</sup>				
西洋芝 (ヘントグラス)	炭疽病	300~800 倍	0.5 ℓ/m <sup>2</sup>				
パイナップル	根腐萎凋病	500 倍	300~400ℓ/ 10a	収穫 21 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内
もも	縮葉病	600 倍	200~700ℓ/ 10a	発芽前	4 回以内	散布	4 回以内
しょうが	白星病		100~300ℓ/ 10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	5回以内 (塊茎粉衣は 1 回以内、 灌注は 2 回以内、散布 は 2 回以内)
ごぼう	黒斑病	800 倍	200~700ℓ/ 10a	収穫 14 日 前まで	5 回以内	散布	6 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、 は種後は 5 回以内)
パパイヤ	炭疽病	600 倍		収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内
マンゴー					5 回以内	散布	5 回以内
かき	落葉病、炭疽病 すす点病	1000 倍	100~300ℓ/ 10a	—	8 回以内	散布	8 回以内
花き類・観葉植物 (ばら、りんどう、 せんにちこう、コス モス、ひまわり、シネ ラリア、スイピー、み やこわすれ、アンス リウム、斑入りアマド コロを除く)	茎腐病 立枯病 苗立枯病	600 倍					
ばら	黒星病	800 倍					
	茎腐病、立枯病 苗立枯病	600 倍					
りんどう	葉枯病、茎腐病、 立枯病、苗立枯病						
せんにちこう	斑葉病、茎腐病、 立枯病、苗立枯病						
コスモス	そうか病、茎腐病、 立枯病、苗立枯病						
ひまわり	べと病、黒斑病、 茎腐病、立枯病、 苗立枯病						
シネラリア	褐斑病、茎腐病、 立枯病、苗立枯病						
スイピー	腰折病、茎腐病、 立枯病、苗立枯病						
みやこわすれ アンスリウム	根腐病、茎腐病、 立枯病、苗立枯病						
斑入り アマドコロ	斑点病、茎腐病、 立枯病、苗立枯病						

## アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)

### 土壌病害と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 又は使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	キャプタンを含む 農薬の 総使用回数
トマト きゅうり なす メロン すいか しろうり かぼちゃ	苗立枯病	種子重量の 0.2~0.4%	—	は種前	1回	種子粉衣	5回以内 (種子粉衣は 1回以内)
		800倍	2 l/m <sup>2</sup>	は種後 2~3葉期	5回以内	ジョウロ又は 噴霧機で 全面散布	
ピーマン		種子重量の 0.2~0.4%	—	は種前	1回	種子粉衣	2回以内 (種子粉衣は 1回以内)
とうがらし類		800倍	2 l/m <sup>2</sup>	は種後 2~3葉期	2回以内	ジョウロ又は 噴霧機で 全面散布	3回以内 (種子粉衣は 1回以内、は種 後は2回以内)
しょうが	根茎腐敗病	400倍	3 l/m <sup>2</sup>	収穫30日 前まで	2回以内	灌注	5回以内 (塊茎粉衣は1 回以内、灌注は 2回以内、散布 は2回以内)
		塊茎重量の 2%	—	植付前	1回	塊茎粉衣	
チューリップ	青かび病	800~1000倍	—	球根掘取時 及び植付時	8回以内	球根浸漬	8回以内
アイリス		400倍		植付前		30分間 球根浸漬	

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	キャプタンを含む 農薬の 総使用回数
野菜類 豆類(種実) 飼料作物 未成熟とうもろこし	ピシウム・リゾグリア菌 による病害 (苗立枯病等)	種子重量の 0.2~0.4%	—	は種前	1回	種子処理機 による 種子粉衣	1回
花き類・観葉植物							8回以内

### 適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用回数	使用方法	キャプタンを含む 農薬の 総使用回数
			薬量	希釈水量			
西洋芝 (バントグラス)	藻類 コケ類	芝生育期 (雑草発生 初期)	1~2g/m <sup>2</sup>	0.5 l/m <sup>2</sup>	8回以内	散布	8回以内

## アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)