

寄生性天敵

農林水産省登録 第18929号

エンストリップ®

オンシツツヤコバチ剤

コナジラミ類を
長期間防除!!

27
最適温度
18℃



寄生性天敵

農林水産省登録 第21070号

エルカード®

サバクツヤコバチ剤

高温期の
コナジラミ類
防除に!!

30
最適温度
20℃



温度で使い分けて
効果的に防除

IPMで コナジラミ防除



ホリバーとホリバーロール、およびネットを併用して


高性能粘着トラップ(イエロー・ブルー)

ホリバー®

コナジラミを
シャットアウト!

高性能粘着トラップ(イエロー・ブルー)

ホリバーロール®



IPM (総合的病害虫管理) でコナジラミ類を防除

農林水産省登録 第18929号

寄生性天敵 **エンストリップ**[®]

オンシツツヤコバチ剤 **50カード** (50カード/箱 約2,500頭入り)

有効成分：オンシツツヤコバチ羽化雌成虫 50頭/カード
 性状：黒色寄生蜂
 包装：50カード/紙箱

特長

コナジラミ類を
長期間防除します。
(最適温度18℃~27℃)

オンシツコナジラミ・
タバココナジラミともに
高い寄生率を示します。

ホスト・フィーディング
(寄主体液摂取)により
コナジラミ幼虫をツヤコバチ
雌成虫が捕食します。

放飼が簡単。
カードを枝などに
吊り下げるだけです。

適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オンシツツヤコバチを含む農薬の総使用回数
野菜類 (施設栽培)	コナジラミ類	25~30株当り 1カード	発生初期	—	放飼	—
ポインセチア (施設栽培)						

農林水産省登録 第21070号

寄生性天敵 **エルカード**[®]

サバクツヤコバチ剤 **50カード** (50カード/箱 約3,000頭入り)

有効成分：サバクツヤコバチ成虫 3,000頭/箱
 性状：淡黄色寄生蜂
 包装：50カード/紙箱

特長

高温期のコナジラミ類
防除にも効果を発揮します。
(最適温度20℃~30℃)

タバココナジラミ・
オンシツコナジラミともに
高い寄生率を示します。


ホスト・フィーディング
(寄主体液摂取)により
コナジラミ幼虫をツヤコバチ
雌成虫が捕食します。

放飼が簡単。
カードを枝などに
吊り下げるだけです。

適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	サバクツヤコバチを含む農薬の総使用回数
野菜類 (施設栽培)	コナジラミ類	1箱/10a (約3,000頭)	発生初期	—	放飼	—

IPMの必需品



高性能粘着トラップ(イエロー・ブルー)

ホリバー[®]

- コナジラミ類の予察・捕獲にはホリバー(イエロー)を使います。
- 生物農薬との組み合わせで防除率UP!!
- Wカットが入って吊り下げやすくなりました。

使い方いろいろ高性能粘着トラップ(イエロー・ブルー)

ホリバーロール[®]

高い
誘引効果

長い
粘着持続性

コナジラミ類
にはイエロー

30cm幅×
100m巻き
(イエローのみ)
15cm幅×
150m巻き
(イエロー・ブルー)

農林水産省登録 第20691号

微生物
殺虫剤

マイコタール[®] パーティシリウム レカニ水中和剤

- コナジラミ類等に寄生する昆虫病原性糸状菌を有効成分とし、薬剤抵抗性コナジラミ類にも優れた効果を示します。
- 従来の殺虫剤と同等の高い防除効果を発揮します。
- 最適温度18℃~28℃。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	パーティシリウム レカニを含む農薬の総使用回数
野菜類(施設栽培)	コナジラミ類	1,000倍	150~300ℓ/10a	発生初期	—	散布	—
きく(施設栽培)	ミカンキイロアザミウマ						

農薬は正しく使いましゅう ●ラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

天敵はさまざまな防除手段を組み合わせた
IPM(総合的病害虫防除)の中心的な手段として最適です。

アリスライフサイエンス株式会社

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1
 TEL 03-3547-4415 FAX 03-3547-4695
<http://www.agrofrontier.com>