

捕食性天敵

スパイカル® プラス

ミヤコカブリダニ剤

スパイカルが吊り下げ型パックに入って省力化！
長期間防除効果が持続します！



ガーベラ



なす



ミヤコカブリダニ

捕食性天敵

農林水産省登録 第22232号

スパイカル® EX

ミヤコカブリダニ剤

「ゼロ放飼*」で待ち伏せ防除！

※「ゼロ放飼」とは、スパイカルEXを放飼する前に影響の少ない化学農薬を散布してハダニの密度をできるだけ「ゼロ」にした後に放飼することです。



捕食性天敵

農林水産省登録 第21685号

スパイデックス®

チリカブリダニ剤

高い捕獲力と増殖力で
防除の取りこぼしもカバー！



捕食性天敵

スパイカル® プラス

ミヤコカブリダニ剤

100パック入(5,000頭入)

成分:ミヤコカブリダニ…50頭/パック
サヤアシクダニ、ふすま等
性状:淡褐色粒**特長**

天敵はパック表面の穴(放出口)より、数週間つづけて作物上に放出されます。


パック内で守られているために、増殖率と定着率がアップします。

フックを枝などに吊るすだけなので、放飼作業が省力化されます。

■ 適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミヤコカブリダニを含む農薬の総使用回数
野菜類(施設栽培)	ハダニ類	40~120パック/10a (約2,000~6,000頭/10a)	発生初期	—	茎や枝等に吊り下げて放飼	—
豆類(種実)(施設栽培)						
いも類(施設栽培)						
花き類・観葉植物(施設栽培)						

*空袋および使用後の紙パックは圃場などに放置せず適切に処理する。

設置方法

直射日光によるダメージを避けるため、パックは葉の陰や作物の北側に吊り下げてください。紙製のフックが濡れて破れる恐れがあるので、薬剤散布の際にはご注意ください。(必要に応じホチキス等で補強)


パック内で守られているミヤコカブリダニは

- 作物上の餌(花粉、害虫他)不足
- 施設内の湿度低下
- 薬剤などの散布
- 摘葉・摘芯作業による天敵の施設外への持ち出し

などの影響を受けにくく、放出後に高い定着性を示します。

スパイカルの分散イメージ図

(日数は目安です)

**注意**

- 本剤はハダニ類を捕食する天敵であるミヤコカブリダニを含有するパック製剤です。
- パック内でのミヤコカブリダニの生存日数は短いので、入手後速やかに使用し、使いきってください。
- パックは破らずに、作物の茎や枝等に直接またはできるだけ近接して吊り下げて放飼してください。
- ハダニ類の密度が高まってからの放飼は十分な効果が得られないので、ハダニ類の発生初期に最初の放飼をしてください。
- 放飼はできるだけ均一に行うことを原則とするが、ハダニ類の発生にむらがある場合には発生の多いところに重点的に放飼してください。
- ミヤコカブリダニの活動に影響を及ぼすおそれがあるので、本剤の使用期間中に他剤を処理する場合は十分注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

農薬は正しく使いましょう ● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

アリスライフサイエンス株式会社

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1
TEL 03-3547-4415 FAX 03-3547-4695
http://www.agrofrontier.com

吊り下げパックでハダニ類を長期間防除!