



化学殺菌剤  
オーソサイド水和剤 80  
(キャプタン水和剤)

農林水産省登録番号：第 21292 号  
最終変更登録日：2011 年 7 月 8 日

[適用病害虫と使用方法]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病	600~1000 倍	200~700ℓ/10a	収穫 14 日 前まで	6 回以内	散 布	6 回以内
	黒点病	800~1200 倍					
	斑点落葉病 輪紋病、褐斑病 すす点病、すす斑病	600~800 倍					
	炭疽病	800 倍					
なし	赤星病、黒星病 輪紋病	600~1000 倍		収穫 3 日 前まで	9 回以内		9 回以内
	疫 病	1000 倍					
	炭疽病	800 倍					
ぶどう	晩腐病、褐斑病 灰色かび病、べと病 枝膨病、黒とう病	800 倍		収穫 45 日 前まで	2 回以内		2 回以内
おうとう	せん孔病 灰星病、炭疽病			収穫 14 日 前まで	5 回以内		5 回以内
マルメロ	黒点病	1000 倍			6 回以内		6 回以内
小粒核果類	黒星病	800~1000 倍	収穫 21 日 前まで	3 回以内	3 回以内		
	すす斑症	800 倍					
ブルーベリー	斑点病	500~1000 倍	2 回以内	2 回以内	2 回以内		
	すす点病	500 倍					
はくさい	黒斑病、白斑病 苗立枯病	600~1200 倍	100~300ℓ/10a	収穫 7 日 前まで	5 回以内	6 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、は種 後は 5 回以内)	
	べと病	600 倍					
トマト	疫 病	800~1200 倍		収穫前日 まで		5 回以内	5 回以内 (種子粉衣は 1 回以内)
	葉かび病 灰色かび病	800 倍					
きゅうり	炭疽病、褐斑病	600~800 倍		収穫 14 日 前まで		5 回以内	5 回以内 (種子粉衣は 1 回以内)
	べと病	600 倍					
すいか	べと病、つる枯病			収穫 14 日 前まで		5 回以内	5 回以内 (種子粉衣は 1 回以内)
メロン	炭疽病	400~800 倍					
しろうり	べと病	600 倍		収穫 前日 まで		5 回以内	6 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、は種 後は 5 回以内)
かぼちゃ	炭疽病	400~800 倍					
たまねぎ	灰色かび病 白色疫病 苗立枯病	600 倍	収穫 前日 まで	3 回以内	4 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、は種 後は 3 回以内)		
葉たまねぎ			収穫 7 日 前まで				
セルリー	葉枯病		収穫 21 日 前まで	3 回以内	4 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、は種 後は 3 回以内)		



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャブタンを含む農薬の総使用回数
いちご	灰色かび病 炭疽病、芽枯病	800倍	100~300ℓ/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
いんげんまめ	炭疽病	600~1200倍			2回以内		3回以内 (種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)
ゆきやなぎ	苗立枯病	1000倍	200~700ℓ/10a	—	8回以内		8回以内
芝	葉腐病 (ブラウンパッチ)	300~500倍	1㎡当り 0.5~2ℓ	発病初期			
	赤焼病	300~800倍	1㎡当り 1~2ℓ				
たばこ	赤星病	800倍	25~180ℓ/10a	収穫10日前まで	2回以内		2回以内
パイナップル	根腐萎凋病	500倍	300~400ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
もも	縮葉病	600倍	200~700ℓ/10a	発芽前	4回以内		4回以内
ごぼう	黒斑病	800倍	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	5回以内		6回以内 (種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内)
パパイヤ	炭疽病	600倍	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
マンゴー							
かき	落葉病、炭疽病 すす点病	1000倍			5回以内	5回以内	
花き類・観葉植物 (ばら、りんどう、せんにちこう、コスモス、ひまわり、シネラリア、スイトピー、みやこわすれ、アンズリウム、斑入りアマドコロを除く)	茎腐病 立枯病 苗立枯病	600倍	100~300ℓ/10a	—	8回以内	8回以内	
ばら	黒星病	800倍					
	茎腐病、立枯病 苗立枯病	600倍					
りんどう	葉枯病、茎腐病 立枯病、苗立枯病						
せんにちこう	斑葉病、茎腐病 立枯病、苗立枯病						
コスモス	そうか病、茎腐病 立枯病、苗立枯病						
ひまわり	べと病、黒斑病 茎腐病、立枯病 苗立枯病						



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャブタを含む農薬の総使用回数
シネラリア	褐斑病、茎腐病 立枯病、苗立枯病	600倍	100~300ℓ/10a	—	8回以内	散布	8回以内
スイトピー	腰折病、茎腐病 立枯病、苗立枯病						
みやこわすれ アンスリウム	根腐病、茎腐病 立枯病、苗立枯病						
斑入り アマドコロ	斑点病、茎腐病 立枯病、苗立枯病						

土壌病害

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 又は使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャブタを含む農薬の総使用回数
トマト きゅうり なす メロン すいか しろりり かぼちゃ	苗立枯病	種子重量の 0.2~0.4%	—	は種時	1回	粉衣	5回以内 (種子粉衣は 1回以内)
		800倍	1㎡当り 2ℓ	は種後 2~3葉期	5回以内	ジョウロ又は 噴霧機で 全面散布	
ピーマン		種子重量の 0.2~0.4%	—	は種時	1回	粉衣	2回以内 (種子粉衣は 1回以内)
とうがらし類		800倍	1㎡当り 2ℓ	は種後 2~3葉期	2回以内	ジョウロ又は 噴霧機で 全面散布	3回以内 (種子粉衣は 1回以内、は種 後は2回以内)
チューリップ	青かび病	800~1000倍	—	球根掘取時 及び植付時	8回以内	球根浸漬	8回以内
アイリス		400倍		植付前		30分間 球根浸漬	

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャブタを含む農薬の総使用回数
野菜類 豆類 (種実) 飼料作物 未成熟とうもろこし	ピシウム・リゾク トニア菌 による病害 (苗立枯病等)	種子重量の 0.2~0.4%	—	は種前	1回	種子処理機 による 種子粉衣	1回
花き類・観葉植物							8回以内