



平成 23 年 6 月 22 日

お客様各位

アリスタ ライフサイエンス株式会社
日本事業本部

「トクチオン[®]乳剤」適用拡大のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社化学殺虫剤「トクチオン[®]乳剤（登録番号：第 13426 号）」におきまして、2011 年 6 月 22 日付けで適用拡大となりましたので、ご連絡いたします。適用拡大内容は以下の通りです。変更後の適用病害虫の範囲および使用方法は別紙に示します。

使用者様及びお取扱各位への周知徹底についてご協力を賜りたく何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

【変更内容】

- 作物名「たまねぎ」の使用時期を「収穫 30 日前まで」から「収穫 7 日前まで」へ、本剤の使用回数を「3 回以内」から「4 回以内」へ、プロチオホスを含む農薬の総使用回数を「3 回以内」から「4 回以内」へ変更する。
- 作物名「花き類・観葉植物（ばら、きく、プリムラ、シクラメン、ベゴニア、宿根かすみそうを除く）」を追加し、ばら、プリムラ、シクラメン、ベゴニア及び宿根かすみそうにアザミウマ類を追加し、きくのみカンキョウアザミウマをアザミウマ類に変更するとともにガーベラ及びグラジオラスを削除する。
- 作物名「芝」のプロチオホスを含む農薬の総使用回数を「3 回以内」から「5 回以内」へ変更する。
- 作物名「庭木」を、「樹木類（つばき類、さくら、プラタナスを除く）」へ変更し、つばき類、さくら及びプラタナスにフラワーバラゾウムシを追加する。

- 作物名「みかん」、「なし」、「かき」、「くり」、「つばき類」、「さくら」、「プラタナス」及び「樹木類（つばき類、さくら、プラタナスを除く）」の使用液量を「200～700L/10a」とする。
- 作物名「キャベツ」、「にんにく」、「ばれいしょ」、「かんしょ」、「あずき」、「だいず」、「てんさい」、「しょうが」、「いちご」、「ばら」、「きく」、「プリムラ」、「シクラメン」、「ベゴニア」、「宿根かすみそう」、「花き類・観葉植物（ばら、きく、プリムラ、シクラメン、ベゴニア、宿根かすみそうを除く）」及び「たまねぎ」の希釈倍数 1000 倍の使用液量を「100～300L/10a」とする。
- 作物名「茶」の使用液量を「200～400L/10a」とする。
- 作物名「たばこ」の使用液量を「25～180L/10a」とする。
- 作物名「たまねぎ」の希釈倍数 300 倍の使用方法を「散布」とし、使用液量を「25L/10a」とする。
- 作物名「さとうきび」の使用方法を「土壌灌注」とし、使用液量を「1.8L/m²」とする。
- 作物名「芝」の使用方法を「散布」とし、使用液量を「0.5～1L/m²」とする。

【お問い合わせ先】

アリスタ ライフサイエンス株式会社 日本事業本部 (Tel:03-3547-4416)



(別紙)

■ トクチオン®乳剤【変更後の適用病害虫の範囲および使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロホリスを含む農薬の総使用回数			
みかん	コカモンハマキ、フジコナカイラムシ フラーハラゾウムシ	1000倍	200~700L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内			
なし	コナカイラムシ類、ハマキムシ類			収穫60日前まで	5回以内		5回以内			
かき	カキハタムシカ、フジコナカイラムシ マイマイカ、アザミウマ類、ハマキムシ類			収穫75日前まで	2回以内		2回以内			
くり	モモノコマダラノメカ ネズギノカワカ			裂果前まで (但し 収穫7日前まで)	5回以内		5回以内			
キャベツ	コナカ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アオムシ ウリハ類、アブラムシ類		100~300L/10a	収穫21日前まで	2回以内		2回以内			
たまねぎ	アザミウマ類	300倍	25L/10a	収穫7日前まで	4回以内		4回以内			
にんにく	ネギコカ	1000倍	100~300L/10a	収穫14日前まで	3回以内		散布	3回以内		
ばれいしょ	シヤカイモカ、ヨトウムシ、アブラムシ類			収穫21日前まで				3回以内	3回以内 (植付時の土 壌混和は1回 以内)	
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナジメロシタハ								3回以内	3回以内
あずき	フキノメカ、ツメクサカ									
だいず	マメシクカ、シロイモジマダラメカ ハスモンヨトウ、アブラムシ類、ツメクサカ			収穫30日前まで		5回以内		5回以内		
てんさい	ヨトウムシ、テンサイモクリハハエ テンサイヒメハムシ、カメノコハムシ		200~400L/10a	摘採21日前まで	1回	1回				
茶	ハマキムシ類、チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ		1.8L/m ²	収穫90日前まで	2回以内	2回以内		2回以内 (植付時の土 壌混和は1回 以内)		
さとうきび	アトウカネ ハリカネムシ類		100~300L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布		3回以内		
しょうが	アワノメカ			収穫75日前まで				3回以内 (仮 植床 植付時の土壌 混和は1回以 内)		
いちご	ハダニ類、キンケチアブラムシ成虫									



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロチリスを含む農薬の総使用回数
花き類・観葉植物 (ばら、きく、プリムラ、シクラメン、ベゴニア、宿根かすみそうを除く)	アザミウマ類	1000倍	100～300L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
ばら	アブラムシ類、フラハラゾウムシ			—	5回以内		5回以内
きく	アザミウマ類		発生初期				
プリムラ シクラメン ベゴニア	キンケチフトゾウムシ成虫 アザミウマ類		—				
つばき類	チャドクガ、フラハラゾウムシ		—	3回以内	3回以内		
さくら プラタナス	アメリカシロヒトリ フラハラゾウムシ		200～700L/10a	4回以内	4回以内		
宿根かすみそう	ヨトウムシ、ナスモグリハエ アザミウマ類		100～300L/10a	6回以内	6回以内		
芝	シバツトガ		0.5～1L/m ²	発生初期	3回以内		5回以内
たばこ	タバコアオムシ、ヨトウムシ、アブラムシ類 ジャガイモガ、アザミウマ類		25～180L/10a	収穫10日前まで	2回以内		2回以内
樹木類 (つばき類、さくら、プラタナスを除く)	フラハラゾウムシ		200～700L/10a	—	5回以内		5回以内