

マルハナバチへの農薬影響表（クロマルハナバチ、セイヨウオオマルハナバチ共通）

（2020年1月改定）

殺虫・殺ダニ剤		殺虫・殺ダニ剤		殺菌剤	
商 品 名	影響日数	商 品 名	影響日数	商 品 名	影響日数
アーデント	3	ダントツ（粒）	21	アフエット	1
アクセル	8	ダントツ（水）	15以上	アミスター	1
アカリタッチ	0	チェス	0	アリエッティ	2
アクタラ（粒）	21	ディアナ	1～3	アントラコール	1
アクタラ（水）	42	テルスター	30	イオウフロアブル	0
アクテリック	14	トランスフォーム	2～5	オーソサイド	0
アクセルフロアブル	8	トリガード	1	オルパ	0
アグリメック	7～14	トルネード	6	カスミン	0
アグロスリン	20以上	トレボン	20以上	ガッテン/ショウチノスケ	0
アタブロン	4	ニッソラン	1	カリグリーン	0
アディオン	20以上	ネマキック	14以上	カンタス	0
アドバンテージ（粒）	21	ネマトリン	14以上	クムラス	0
アドマイヤー（粒）	35以上	ノーモルト	1	ゲッター	0
アドマイヤー（水）	30以上	バイデート(粒)	14	サブロール	0
アニキ	1	バリアード	1	サンヨール	0
アフアーム	2	BT剤（ジャックポットなど）	1	ジーファイン	0
アフアームエクセラ	2	ピラニカ	1	ジマンダイセン	0
アブロード	1	ファインセーブ	1	ジャストミート	0
アブロードエース	1	ファルコン	1	スクレア	1
アルバリン/スタークル（粒）	10以上	フェニックス	1	ストロビー	0
アルバリン/スタークル（水）	14以上	ブレオフロアブル	1	スミレックス	0
ウララ	0	ブレバソン	1	セイビアー	0
オルトラン（粒）	14～30	ブリファード	0	ダコニール	0
オルトラン（水）	10～20	ブリロッソ	1	銅剤	0
オレート	1	ベストガード（水）	10以上	トップジンM	0
カウンター	1	ベストガード（粒）	30以上	トリフミン	1
カスケード	2	ベネビア	1	ネクスター	1
カネマイト	2	ベミデタッチ	0	パレード	1
気門封鎖剤	0	ベリマーク	1	バチスター	0
クリアザール	1	パルミノ（モレスタン）	3～5	ピクシオ	0
グレーシア	1	ボタニガード（ES、水）	1	ピシロック	0
コテツ	9	マイコタール	1	ファンタジスタ	0
コルト	3～7	マイトコーネ	1	ファンベル	1
コロマイト	1	マッチ	0	ブリザード	1
サイハロン	4	マトリック	1	フルピカ	0
サンクリスタル	1	マブリック	2～3	プロパティ	0
スカウト	2	マラソン	30	ベジセイバー	-
スターマイト	1	ミネクトデュオ	21	ベルコート	0
スピノエース	3～7	モスピラン	1～3	ベンレート	0
スブラサイド（水）	30	モベント	45以上	ホライズン	0
スミチオン	20以上	ラグビーMC（粒）	30以上	ポリオキシシAL	0
ダイアジノン	30	ラノー	0	モレスタン	3～5
ダニコング	1	ロディー	14以上	ライメイ	1
ダニサラバ	1			ランマン	0
ダニトロン	1			ルビゲン	0
ダブルシューター	3			レーバス	1
ダブルフェース	1			ロブラール	0

影響日数に「以上」という表記がある剤は、農薬の影響が長期に残る可能性があります

注）農薬散布する時は、散布前にマルハナバチを巣箱に回収し、別の場所で保管して下さい。

再放飼する時は、影響日数をあけて行って下さい。影響0日の薬剤は、薬液が乾燥してから行って下さい。

表中の影響日数はあくまで目安であり、濃度、散布量、環境条件、気象条件等によっても異なります。

※この表は日本生物防除協議会、農薬メーカー、試験研究所などの情報を基にアリストライフサイエンス（株）の知見を加え作成しています。