

殺虫剤
オルトラン粒剤
(アセフェート粒剤)

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数			
キャベツ	アオムシ、コナガヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)			
	アザミウマ類	6kg/10a (2g/株)							
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期		散布				
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時		1回		作条散布 又は植穴処理	1回	
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ								
ピーマン	アブラムシ類								2g/株
はくさい	アオムシ、コナガヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)							植穴処理
ブロッコリー	ヨトウムシ アザミウマ類	6kg/10a (2g/株)		株元散布					
だいこん	アオムシ、コナガアブラムシ類	3～4kg/10a	は種前	作条散布					

アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫 21 日前まで	1 回	株元散布	1 回
ごぼう		3～6kg/10a	収穫 75 日前まで			2 回以内 (株元散布は 1 回以内、散布は 1 回以内)
れんこん		4kg/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布 無人航空機による散布	2 回以内
ばれいしょ		3～6kg/10a (1～2g/株)	植付時	1 回	作条散布	3 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内)
えだまめ	ハスモンヨトウ	3～6kg/10a	収穫 21 日前まで	3 回以内	生育期株元散布	3 回以内
なばな類	アブラムシ類	6kg/10a	定植時	1 回	植溝土壌混和	1 回
こまつな			は種時		播溝土壌混和	
花き類・ 観葉植物 (きく、宿根スターチス、カーネーション、アリウム、たदैいを除く)	アザミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a	発生初期	5 回以内	株元散布	5 回以内
宿根スターチス	ヨトウムシ類	6kg/10a				
	アザミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a				
カーネーション	コカネムシ類幼虫 ヨトウムシ類	6kg/10a				
	アザミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a				
アリウム	コナガ ヨトウムシ類	6kg/10a				
	アザミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a				
きく	ネギコガ ヨトウムシ類	6kg/10a				
	アザミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a				
つつじ類	ネキリムシ類 ハモグリバエ類 ヨトウムシ類	6kg/10a				
	ツツジガンバイ	12kg/10a				
さくら(幼木)	ケムシ類		生育期			

アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
たदैあい	アブラムシ類	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当たり50g	定植時	1回	本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。	1回
		6kg/10a			株元散布	
いぐさ	イグサシムシガ	4kg/10a	生育期	2回以内	湛水散布	2回以内
芝	スジキリヨトウシバツガ	10kg/10a	発生初期	5回以内	全面散布	5回以内
	タマナヤガ	5～10kg/10a				
たばこ	ヨトウムシ、ネキリムシ アブラムシ類 アザミウマ類 ジャガイモガ ヤサイゾウムシ	3～6kg/10a	移植前	1回	作条散布後 土壌混和	2回以内
	アブラムシ類		本畑初期		株元散布	

アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)