

殺虫剤
オルトラン水和剤
(アセフェート水和剤)

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマキギンウワバ	1000～1500 倍	100～300 L/10a	収穫 30 日 前まで	1 回	散布	2 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の散布は 1 回以内)		
	アオムシ、コナガ、アブラムシ 類	1000～2000 倍							
	アザミウマ類	1000 倍							
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500 倍			1500～2000 倍		1 回		
	アオムシ、コナガ、アブラムシ 類								
レタス	ヨトウムシ	1000～1500 倍			1000～1500 倍		3 回以内	3 回以内	
	アザミウマ類 アブラムシ類 オオタバコガ	1000 倍							
	アオムシ								
非結球レタス	アザミウマ類 アブラムシ類 オオタバコガ	1000 倍			1000 倍		収穫 14 日 前まで	3 回以内	3 回以内
カリフラワー	ヨトウムシ	1000 倍					収穫 21 日 前まで		
非結球 あぶらな科葉菜類 (ケール、からしな、 みずな、ルッコラ、 たかなを 除く)	アブラムシ類	1500 倍	1000 倍	収穫 21 日 前まで	1 回	1 回			
しょうが	アワノメイガ	1000 倍		2 回以内	2 回以内				
ごぼう	アブラムシ類	1000 倍	1000 倍	収穫 45 日 前まで	1 回	2 回以内 (株元散布は 1 回以内、散布 は 1 回以内)			

アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ	1000 倍	100~300 L/10a	収穫開始 7 日前まで	1 回	散布	1 回
ばれいしょ	テトウムシダマシ幼虫 ヨトウムシ			300 倍	25L/10a		収穫 30 日 前まで
	アブラムシ類						
てんさい	アブラムシ類、ジャガイモガ	1000~1500 倍	100~300 L/10a	収穫 45 日 前まで	3 回以内	無人ヘリコ プターによる 散布	4 回以内 (育苗期の灌注は 1 回以内、散布は 3 回以内)
	ヨトウムシ テンサイモグリハナハエ						
	トビハムシ類	16 倍	1.6L/10a				
	ヨトウムシ						
	トビハムシ類	60~100 倍	2.5~3 L/m ²				
未成熟 とうもろこし	アブラムシ類	1000 倍	100~300 L/10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内
あずき	アズキノメイガ、アブラムシ類 ヨトウムシ			収穫 14 日 前まで	3 回以内		3 回以内
だいず	ハスモンヨトウ、マメシクイガ アブラムシ類			16 倍			

アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
えだまめ	ハスモンヨトウ アブラムシ類	1000 倍	100~300 L/10a	収穫 21 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内
いんげんまめ	アブラムシ類 インゲンマメゾウムシ			収穫 14 日 前まで			
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000~1500 倍	25L/10a	収穫 21 日 前まで	5 回以内	無人ヘリコプ ターによる 散布	5 回以内
		300 倍					
たまねぎ	ネギアザミウマ	16 倍	1.6L/10a	収穫 21 日 前まで	5 回以内	無人ヘリコプ ターによる 散布	5 回以内
にんにく	ネギコガ アブラムシ類	1000 倍	100~300 L/10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内		2 回以内
ぶどう	チャノキアザミウマ フタテンヒメコバエ	1500~2000 倍	200~700 L/10a	収穫 60 日 前まで	1 回		1 回
	ハマキムシ類	1500 倍		収穫 45 日 前まで	2 回以内	2 回以内	
かき	カキクダアザミウマ チャノキアザミウマ カキノヘタムシガ フジコナカイガラムシ		1500 倍				200~700 L/10a
いちじく	アザミウマ類	2000 倍					
茶	チャノキアザミウマ チャノドリヒメコバエ	1000~2000 倍	200~400 L/10a	摘採 45 日 前まで	1 回		1 回
	チャノコカクモンハマキ	1000~1500 倍					
さんしょう (果実)	チャノキアザミウマ	1500 倍	200~700 L/10a	収穫 14 日 前まで			
だいおう	ヨトウムシ	1000 倍		生育期 但し、 収穫 230 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内
みしまさいこ	アブラムシ類	1500 倍	100~300 L/10a	収穫 30 日 前まで	5 回以内		5 回以内
薬用にとんじん				収穫 180 日 前まで			
ソルガム	アブラムシ類 ツマジロクサヨトウ	1000 倍		収穫 30 日 前まで	3 回以内		3 回以内
やまのいも	ヤマノイモコガ アブラムシ類			収穫 45 日 前まで	1 回	1 回	
葉しょうが	アワノメイガ			収穫 21 日 前まで			
たばこ	ヨトウムシ、タバコアオムシ アブラムシ類	1500~2500 倍	25~180 L/10a	収穫 10 日 前まで	2 回以内		2 回以内
	ヤサイゾウムシ	1000~2000 倍	1L/m ²	苗床期			
	ジャガイモガ若齢幼虫 ジャガイモガ中齢幼虫	1500~2000 倍	25~180 L/10a	収穫 10 日 前まで			

アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
つつじ類	ツツジゲンハイ	1500 倍	200～700 L/10a	発生初期	5 回以内	散布	5 回以内
つばき類	チャトクガ						
さくら	モンクロシヤチホコ	1000～1500 倍					
	アメリカシロヒトリ	1500～2000 倍					
花き類・観葉植物	アザミウマ類、アブラムシ類	1000～1500 倍	100～300 L/10a				
	アオムシ、ヨウムシ類						
きく	マメハモグリハエ オオタバコガ						
ストック	コナガ、ハイマダラノメイガ						
宿根アスター	ヨメナスジハモグリハエ						
オンシジウム	カイガラムシ類						
カーネーション	コナガ						
ひまわり	タバコガ						
斑入りアマドコロ リアトリス	ハマキムシ類	1000 倍					
樹木類		200～700 L/10a					
グラジオラス	アザミウマ類	—		植付時	1 回	10 分間 球根 浸漬	
芝	シバツトガ タマネヤガ	0.25～2L/m ²	発生初期	5 回以内	散布		
	スジキリヨトウ ケラ	1～2L/m ²					
	シバオサゾウムシ成虫	2L/m ²					
	アカフツツリガ	0.5～1L/m ²					
もりあざみ	アブラムシ類	1500 倍	100～300 L/10a	収穫 45 日 前まで	1 回	1 回	
まめ科牧草		1000 倍			3 回以内	3 回以内	

アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)