

除草剤  
**セレクト乳剤**  
(クレトジム乳剤)

## 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	クレトジムを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
かんしょ	一年生 イネ科雑草	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 100 日前まで	50~75ml /10a	100L /10a	1 回	雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布	1 回
ばれいしょ		雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 30 日前まで					
キャベツ ねぎ だいこん		雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 21 日前まで					
たまねぎ		雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 40 日前まで					
にんじん		雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 30 日前まで					
にんにく		雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 30 日前まで					
アスパラガス		雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫前日まで					
ひまわり (種子)		雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 30 日前まで					
かぼちゃ		雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 45 日前まで					
かのこそう	水田一年生 イネ科雑草	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 45 日前まで	75ml /10a		3 回 以内	雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布 (落水)	3 回 以内
いぐさ		落水後雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) (入水 15 日前まで)					

**アリスタライフサイエンス株式会社**

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	クルトジムを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
あずき	一年生イネ科雑草 (スズメカサバを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期)	35~50ml /10a	100L /10a	1 回	雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布	1 回
	スズメカサバ	収穫 45 日前まで	50~75ml /10a				
いんげん まめ	一年生イネ科雑草 (スズメカサバを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期)	35~50ml /10a	100L /10a	1 回	雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布	1 回
	スズメカサバ	収穫 60 日前まで	50~75ml /10a				
だいず	一年生イネ科雑草 (スズメカサバを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期)	35~50ml /10a	100L /10a	1 回	雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布	1 回
		雑草生育期 (イネ科雑草 5~8 葉期)	50~75ml /10a				
	収穫 50 日前まで						
えだまめ	一年生イネ科雑草 (スズメカサバを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草 5~8 葉期)	50~75ml /10a	100L /10a	1 回	雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布	1 回
		雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期)	35~50ml/ 10a				
	スズメカサバ	収穫 14 日前まで	50~75ml /10a				
てんさい	一年生イネ科雑草 (スズメカサバを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期)	35~50ml /10a	100L /10a	2 回 以内	雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布	2 回 以内
		雑草生育期 (イネ科雑草 5~8 葉期)	50~75ml /10a				
	収穫 30 日前まで						
	シバムギ レットトップ スズメカサバ	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期)	50~75ml /10a				

## アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)