

殺虫剤  
**トクチオン乳剤**  
(プロチオホス乳剤)

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロチオホスを含む農薬の総使用回数	
ばら	アブラムシ類、フラーバラゾウムシ アザミウマ類、ハダニ類	1000倍	100~300L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内	
きく								
プリムラ シクラメン ペゴニア	キンケクチフトゾウムシ成虫 アザミウマ類、ハダニ類							
宿根かすみそう	ヨトウムシ、ナスハモグリバエ アザミウマ類、ハダニ類		200~700L/10a		6回以内		6回以内	
つばき類	チャドクガ、フラーバラゾウムシ				3回以内		3回以内	
さくら プラタナス	アメリカシロヒトリ フラーバラゾウムシ				4回以内		4回以内	
樹木類(つばき類、 さくら、プラタナスを 除く)	フラーバラゾウムシ		5回以内		5回以内			
たばこ	タバコアオムシ、ヨトウムシ、アブラムシ類 ジャガイモガ、アザミウマ類		25~180L/10a		収穫10日前まで		2回以内	2回以内
芝	シバツトガ		0.5~1L/m <sup>2</sup>		発生初期		3回以内	5回以内

**アリスタライフサイエンス株式会社**

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロオホスを含む農薬の総使用回数
みかん	コカモンハマキ、 フラーパラゾウムシ	1000倍	200~700L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
	フジコナカイガラムシ	1000~ 1500倍					
なし	コナカイガラムシ類、ハマキムシ類	1000倍		収穫60日前まで	5回以内		5回以内
かき	カキノヘタムシカ、フジコナカイガラムシ マイマイカ、アザミウマ類、ハマキムシ類			収穫75日前まで	2回以内		2回以内
くり	モモノコマダラノメイガ ネスシキノカワガ			裂果前まで (但し 収穫7日前まで)	5回以内		5回以内
キャベツ	コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アオムシ ウワバ類、アブラムシ類	300倍	100~300L/10a	収穫21日前まで	2回以内		2回以内
たまねぎ	アザミウマ類		25L/10a	収穫7日前まで	4回以内		4回以内
にんにく	ネギコガ チュールツツサビダニ	1000倍	100~300L/10a	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
ばれいしょ	ジャガイモガ、ヨトウムシ、アブラムシ類						
かんしょ	ハスモンヨトウ			1000~ 2000倍		収穫21日前まで	
	ナカジロシタバ						
あずき	アスキノメイガ、ツメクサガ ハダニ類	1000倍		2回以内	2回以内		
だいず	マメシクイガ ハダニ類	1000~ 1500倍	100~300L/10a	収穫30日前まで	3回以内	3回以内	
	シロイチモジマダラメイガ ハスモンヨトウ、アブラムシ類 ツメクサガ、カメムシ類	1000倍					
てんさい	ヨトウムシ、カメノコハムシ アブラムシ類	1000~ 1500倍		1000倍	2回以内	2回以内	
	テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ ハダニ類						
茶	ハマキムシ類、チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ、チャドクガ	200~400L/10a	200~400L/10a	摘採21日前まで	1回	1回	

## アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロチオホスを含む農薬の総使用回数
さとうきび	アオトウガネ ハリガネムシ類	1000倍	1.8L/m <sup>2</sup>	収穫90日前まで	2回以内	土壌灌注	2回以内 (植付時の土壌混和は1回以内)
にら	ネダニ類	2000倍	3L/m <sup>2</sup>	収穫21日前まで	1回	株元灌注	2回以内 (土壌混和は1回以内、株元灌注は1回以内)
らっきょう				収穫60日前まで			1回
ねぎ	アザミウマ類	1000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	ネダニ類	2000倍	3L/m <sup>2</sup>			株元灌注	
いちご	ハダニ類、キンケウチフトゾウムシ成虫	1000倍	100~300L/10a	収穫75日前まで	3回以内	散布	3回以内(仮植床植付時の土壌混和は1回以内)
花き類・観葉植物 (ばら、きく、プリムラ、シクラメン、ペゴニア、宿根かすみそを除外)	アザミウマ類、ハダニ類			発生初期			5回以内

## アリスタライフサイエンス株式会社

東京都中央区明石町 8-1

■使用上の注意事項などについては、アリスタの Web サイトを参照してください。(www.arystalifescience.jp)