

えだまめ・大豆の やる気スイッチ オン!



ハーモザイム®

1.1kg
(約1ℓ)

とうもろこし抽出成分配合 窒素・・・1.0 リン酸・・・0.3 カリ・・・2.8

こんな時に、ハーモザイムがおすすめ!

増収
したい!

落莢を
減らしたい!

3粒莢を
増やしたい!

植物由来
葉面散布用
肥料

ハーモザイムの散布適期!



開花期のえだまめ



ハーモザイムの基礎評価

ハーモザイムを与えた植物は、植物ホルモンであるサイトカイニンを生産するための酵素タンパク質の活性が促されることがメキシコ アントニオナロ国立農業自治大学の基礎的評価により明らかにされました。


サイトカイニンとは(参考情報)

- 植物の細胞分裂に必須の植物ホルモン。
- 植物体内では、根で作られ、水分と一緒に地上部へ移動します。
- 葉の老化を抑制し、光合成を活性化します。
- 側枝の伸長を促進します(オーキシンとのバランスによる)。
- 豆類の落莢を抑制します。

ハーモザイムの効果

ハーモザイムでサイトカイニンの生産が活性化され、着花・結実の活性化、子実肥大と転流促進、環境ストレスの軽減に効果的です。

■ えだまめの生育経過(一生)とおもな栽培管理(露地栽培)




■ ハーモザイムの施用適期

品種	利用場所	適応地域	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
極早生～早生種	露地 (マルチ含む)	暖地 温暖地 寒冷地										
中晩生～晩生種	露地	温暖地 寒冷地										

● 播種時期 🌸 開花初期=ハーモザイムの施用適期 🟡 収穫時期

天候不順などの影響で、開花期が長引く場合は、二度目の散布をおすすめします。

■ 実施例 (2017年 社内試験)



使用上の 注意

《使用上の注意》ご使用前にラベルをよくお読みください。

●使用前によく振ってからお使いください。 ●使用量に合わせ散布液を調製し、使いきってください。 ●調製した散布液はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。 ●高温時には、日中の散布をさけてください。 ●強いアルカリ性の農薬・肥料等との混用はさけてください。

《安全使用上の注意》飲用不可。飲まないでください。

●小児の手の届くところには置かないでください。 ●誤飲などのないように注意してください。 ●原液は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。 眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の診察を受けてください。

保管…密栓し、火気や直射日光を避け、食品と区別して、冷暗所に保管してください。