

幅広い作物に適用、 あなたの畑の 登録農薬です。



適用拡大!!
たまねぎ/ネギハモグリバエ
未成熟とうもろこし/アワノメイガ
にんにく/アザミウマ類
しょうが/無人航空機
による散布

50年の信頼と実績

オルトラン® 水和剤

- 1 広範囲の害虫に高い効果を示します。
- 2 幅広い作物に適用があります。
- 3 有効成分は優れた浸透移行性を持ち、作物全体に広がります。
- 4 長期間にわたり害虫の発生を抑えます。

ヨトウムシ、アオムシ、コナガ等の食害性害虫から、アブラムシ、スリップス等の吸汁性害虫まで、広範囲の害虫に高い効果を示します。



アオムシ



コナガ



スリップス

オルトラン®水和剤 適用害虫および使用方法

農林水産省登録 第19992号

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む 農薬の総使用回数							
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマナギンウワバ	1000~1500	100~300ℓ/10a	収穫30日前まで	1回	散布	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は1回以内)							
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 アザミウマ類	1000~2000 1000					3回以内	1回						
	はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ、コナガ、アブラムシ類						1500 1500~2000	1回					
レタス	ヨトウムシ アザミウマ類、アブラムシ類、オオタバコガ	1000~1500 1000			3回以内			1回	3回以内					
非結球レタス	ヨトウムシ アザミウマ類、アブラムシ類、オオタバコガ	1000~1500 1000												
カリフラワー	ヨトウムシ	1000		収穫14日前まで	1回		2回以内	1回						
非結球あぶらな科葉菜類 (ケール、からしな、ルッコラ、 四川搾菜(莖葉)、焔わさび、 焔わさび(葉)を除く)	アブラムシ類	1500		収穫21日前まで					2回以内	無人航空機による散布	2回以内 (株元散布は1回以内、散布は1回以内)			
				しょうが								アワノメイガ	1000 32	3.2ℓ/10a
ごぼう	アブラムシ類	1000		100~300ℓ/10a	収穫開始7日前まで		2回以内	散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)					
オクラ	アブラムシ類、フタテンミドリヒメヨコバイ テントウムシダマシ幼虫、ヨトウムシ アブラムシ類、ジャガイモガ		300		25ℓ/10a	収穫30日前まで			3回以内	4回以内 (育苗期の灌注は1回以内、散布は3回以内)				
ばれいしょ	アブラムシ類 アブラムシ類、ジャガイモガ ヨトウムシ、テンサイモグリハナバエ トビハムシ類	1000~1500	100~300ℓ/10a	収穫45日前まで	3回以内	無人航空機による散布 散布 灌注	2回以内							
	てんさい	ヨトウムシ トビハムシ類						1000 16 300 60~100	1.6ℓ/10a 25ℓ/10a 2.5~3ℓ/m ²	育苗期	1回			
	未成熟とうもろこし	アブラムシ類、アワノメイガ						1000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内	
	あずき	アズキノメイガ、アブラムシ類 ヨトウムシ								1000				100~300ℓ/10a
だいず	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ アブラムシ類 アブラムシ類	16	1.6ℓ/10a	収穫21日前まで	5回以内									
えだめ	ハスモンヨトウ、アブラムシ類	1000	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	5回以内									
いんげんまめ	アブラムシ類、インゲンマメゾウムシ	1000	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内							
たまねぎ	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	1000~1500 300 16 1000 300 16	25ℓ/10a 1.6ℓ/10a 100~300ℓ/10a 25ℓ/10a 1.6ℓ/10a	収穫21日前まで				無人航空機による散布 散布 無人航空機による散布						
		にんにく	ネギコガ、アブラムシ類、アザミウマ類					1000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内		
		かき	カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ、フジコナカイガラムシ					1500	200~700ℓ/10a	収穫45日前まで				
		いちじく	アザミウマ類					2000	200~400ℓ/10a	摘採45日前まで			1回	1回
		茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノコカクモンハマキ					1000~2000 1000~1500	200~400ℓ/10a	200~700ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	
		さんしょう(果実)	チャノキイロアザミウマ		1500	200~700ℓ/10a	200~700ℓ/10a	収穫14日前まで						
だいおう	ヨトウムシ	1000	100~300ℓ/10a	生育期 但し、 収穫230日前まで	3回以内	3回以内								
みしまさいこ	アブラムシ類	1500		収穫30日前まで			5回以内	3回以内						
薬用にんじん				収穫180日前まで										
ソルガム				アブラムシ類、ツマジロクサヨトウ	1000	収穫30日前まで			1回	1回				
やまのいも	ヤマノイモコガ アブラムシ類	1000		収穫45日前まで										
葉しょうが	アワノメイガ	1000		100~300ℓ/10a		収穫21日前まで	2回以内	2回以内						
たばこ	ヨトウムシ、タバコアオムシ アブラムシ類	1500~2500	25~180ℓ/10a	収穫10日前まで										
	ヤサイゾウムシ	1000~2000	1ℓ/m ²	育苗期										
	ジャガイモガ若齢幼虫 ジャガイモガ中齢幼虫	1500~2000	25~180ℓ/10a	収穫10日前まで										
つつじ類	ツツジグンバイ	1500	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内	5回以内								
つばき類	チャドクガ													
さくら	モンクロシャチホコ アメリカシロヒトリ						1000~1500 1500~2000							
花き類・観葉植物	アザミウマ類、アブラムシ類 アオムシ、ヨトウムシ類	1000~1500	100~300ℓ/10a	発生初期	5回以内	5回以内								
	きく	マメハモグリバエ、オオタバコガ												
ストック	コナガ、ハイマダラノメイガ													
宿根アスター	ヨメナスジハモグリバエ													
オンシジウム	カイガラムシ類													
カーネーション	コナガ													
ひまわり	タバコガ													
斑入りアマドコロ リアトリス	ハマキムシ類													
樹木類	アザミウマ類	200~700ℓ/10a												
グラジオラス	—	—					植付時	1回	10分間球根浸漬					
芝	シバツトガ、タマナヤガ スジキリヨトウ、ケラ シバオサゾウムシ成虫 アカフツツリガ	— 0.25~2ℓ/m ² 1~2ℓ/m ² 2ℓ/m ² 0.5~1ℓ/m ²					100~300ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布				
	もりあざみ	アブラムシ類									1500	100~300ℓ/10a	収穫45日前まで	1回
	まめ科牧草	アブラムシ類									1000	100~300ℓ/10a	3回以内	3回以内

2024年2月現在の登録内容

●ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届く所には置かない。●空袋は圃場などに放置せず、適切に処理する。

●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望めます。

アリスタライフサイエンス株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目4番1号
TEL 03-5203-9350 FAX 03-5203-9349
<https://www.arystallifescience.jp/>



最新の登録内容