

幅広い作物に適用、 あなたの畑の 登録農薬です。




適用拡大!!
たまねぎ/ネギハモグリバエ
未成熟とうもろこし/アワノメイガ
にんにく/アザミウマ類
しょうが/無人航空機
による散布

50年の信頼と実績

オルトラン® 水和剤

- 1 広範囲の害虫に高い効果を示します。
- 2 幅広い作物に適用があります。
- 3 有効成分は優れた浸透移行性を持ち、作物全体に広がります。
- 4 長期間にわたり害虫の発生を抑えます。

ヨトウムシ、アオムシ、コナガ等の食害性害虫から、アブラムシ、スリップス等の吸汁性害虫まで、広範囲の害虫に高い効果を示します。



アオムシ



コナガ



スリップス

オルトロン[®]水和剤 適用害虫および使用方法

農林水産省登録 第19992号

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマナギンウワバ	1000~1500	100~300ℓ/10a	収穫30日前まで	1回	散布	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は1回以内)	
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 アザミウマ類	1000~2000 1000						
	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500						
はくさい	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1500~2000						
	ヨトウムシ	1000~1500						
レタス	アザミウマ類、アブラムシ類、オオタバコガ	1000						
非結球レタス	ヨトウムシ	1000~1500						
	アザミウマ類、アブラムシ類、オオタバコガ	1000						
カリフラワー	ヨトウムシ	1000						
非結球あぶらな科葉菜類 (ケール、からしな、ルッコラ、 四川搾菜(茎菜)、焔わさび、 焔わさび(葉)を除く)	アブラムシ類	1500						
	アワノメイガ	1000 32						
しょうが	アワノメイガ	1000 32	3.2ℓ/10a	収穫45日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内	
ごぼう	アブラムシ類	1000	100~300ℓ/10a	収穫開始7日前まで	1回	散布	2回以内 (株元散布は1回以内、散布は1回以内)	
オクラ	アブラムシ類、フタテンミドリヒメコバエ テントウムシダマシ幼虫、ヨトウムシ	1000	100~300ℓ/10a	1回	1回		1回	
ばれいしよ	アブラムシ類	300	25ℓ/10a	収穫30日前まで	2回以内		散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)
	アブラムシ類、ジャガイモガ ヨトウムシ、テンサイモグリハナバエ	1000~1500	100~300ℓ/10a	2回以内	2回以内	3回以内		
てんさい	トビハムシ類	1000	100~300ℓ/10a	収穫45日前まで	3回以内	無人航空機による散布 散布 灌注	4回以内 (育苗期の灌注は1回以内、散布は3回以内)	
	ヨトウムシ	16 300						1.6ℓ/10a 25ℓ/10a
	トビハムシ類	60~100						2.5~3ℓ/m ²
未成熟とうもろこし	アブラムシ類、アワノメイガ	1000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
あずき	アスキノメイガ、アブラムシ類 ヨトウムシ	1000	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内		無人航空機による散布	3回以内
だいず	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ アブラムシ類	16	1.6ℓ/10a	収穫60日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内	
えだめ	ハスモンヨトウ、アブラムシ類	1000	100~300ℓ/10a	収穫21日前まで	散布	無人航空機による散布	5回以内	
いんげんまめ	アブラムシ類、インゲンマメゾウムシ	1000	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで				
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000~1500	100~300ℓ/10a	収穫21日前まで	5回以内	無人航空機による散布 散布 無人航空機による散布	5回以内	
		300						25ℓ/10a
		16						1.6ℓ/10a
	1000	100~300ℓ/10a						
	ネギハモグリハエ	300 16						25ℓ/10a 1.6ℓ/10a
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類、アザミウマ類	1000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
かき	カキダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ、フジコナカイガラムシ	1500	200~700ℓ/10a	収穫45日前まで	2回以内		散布	2回以内
いちじく	アザミウマ類	2000	200~700ℓ/10a	1回	1回			
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメコバエ チャノコカクモンハマキ	1000~2000 1000~1500	200~400ℓ/10a	摘採45日前まで	1回	1回		
さんしょう(果実)	チャノキイロアザミウマ	1500	200~700ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	3回以内		
だいおう	ヨトウムシ	1000	100~300ℓ/10a	生育期 但し、 収穫230日前まで	3回以内	3回以内		
みしまさいこ	アブラムシ類	1500	100~300ℓ/10a	収穫30日前まで	5回以内	5回以内		
薬用にんじん	アブラムシ類、ツマジロクサヨトウ	1000	100~300ℓ/10a	収穫180日前まで	3回以内	3回以内		
ソルガム	ヤマノイモコガ アブラムシ類	1000	100~300ℓ/10a	収穫30日前まで	1回	1回		
やまのいも	アワノメイガ	1000	100~300ℓ/10a	収穫45日前まで	1回	1回		
葉しょうが	アワノメイガ	1000	100~300ℓ/10a	収穫21日前まで	2回以内	2回以内		
たばこ	ヨトウムシ、タバコアオムシ アブラムシ類	1500~2500	25~180ℓ/10a	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	ヤサイゾウムシ ジャガイモガ若齢幼虫 ジャガイモガ中齢幼虫	1000~2000 1500~2000	1ℓ/m ² 25~180ℓ/10a	育苗期 収穫10日前まで				
つつじ類	ツツジクンバイ	1500	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内	5回以内	5回以内	
つばき類	チャドクガ	1000~1500	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内			
さくら	モンクロナシャチホコ アメリカシロヒトリ	1000~1500 1500~2000	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内			
花き類・観葉植物	アザミウマ類、アブラムシ類	1000~1500	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内			
	アオムシ、ヨトウムシ類	1000~1500	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内			
きく	マメハモグリハエ、オオタバコガ	1000~1500	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内			
ストック	コナガ、ハイマダラノメイガ	1000~1500	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内			
宿根アスター	ヨメナスジハモグリハエ	1000~1500	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内			
オンシジウム	カイガラムシ類	1000~1500	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内			
カーネーション	コナガ	1000~1500	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内			
ひまわり	タバコガ	1000~1500	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内			
斑入りアマドコロ リアトリス	ハマキムシ類	1000	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内			
樹木類	アザミウマ類	1000	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内			
グラジオラス	アザミウマ類	1000	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内			
芝	シバツトガ、タマナヤガ	1000	0.25~2ℓ/m ²	発生初期	5回以内	散布	1回 3回以内	
	スジキリヨトウ、ケラ	1000	1~2ℓ/m ²					
	シバオサゾウムシ成虫	1000	2ℓ/m ²					
	アカフツツリガ	1000	0.5~1ℓ/m ²					
もりあざみ	アブラムシ類	1500	100~300ℓ/10a	収穫45日前まで	1回	1回		
まめ科牧草	アブラムシ類	1000	100~300ℓ/10a	収穫45日前まで	3回以内	3回以内		

2024年2月現在の登録内容

●ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届く所には置かない。●空袋は圃場などに放置せず、適切に処理する。

●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望まれます。

アリスタライフサイエンス株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目4番1号
TEL 03-5203-9350 FAX 03-5203-9349
https://www.arystallifescience.jp/



最新の登録内容