

畑にオルトラン! お庭にも オルトラン!

樹木類の
ケムシ類にも
適用拡大!



トマト・なす・
きゅうりのネキリムシ類に
オクラのアブラムシ類に
適用拡大!



オルトラン® 粒剤

殺虫剤分類 1B

- 1 広範囲の害虫に高い効果を示します。
- 2 幅広い作物に適用があります。
- 3 浸透移行性で作物の隅々まで行きわたります。
- 4 長期間にわたり害虫の発生を抑えます。

ヨトウムシ、アオムシ、コナガ、ネキリムシ等の食害性害虫から、アブラムシ、スリップス等の吸汁性害虫まで、広範囲の害虫に高い効果を示します。また樹木類におけるチャドクガ、アメリカシロヒトリなどのケムシ類の発生予防にも効果的です。





オルトラ[®]粒剤 適用害虫および使用方法

農林水産省登録 第19993号

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、アブラムシ類 ネキリムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は 1回以内、定植後の 散布は1回以内)	
	アザミウマ類	6kg/10a(2g/株)	育苗期		散布		
	アブラムシ類	6g/m ²			作条散布 又は 植穴処理		
トマト	アブラムシ類、オンシツコナジラミ ネキリムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)			定植時	植穴処理	1回
きゅうり なす	アブラムシ類、アザミウマ類、オンシツコナジラミ ネキリムシ類		作条散布 又は 植穴処理				
ピーマン	アブラムシ類		2g/株			植穴処理	
	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、アブラムシ類 ネキリムシ類	3～6kg/10a(1～2g/株)	株元散布				
はくさい	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、アブラムシ類 ネキリムシ類	3～6kg/10a(1～2g/株)	は種前			播溝土壌混和	
こまつな	アブラムシ類	6kg/10a	定植時			株元散布	
ブロッコリー	ヨトウムシ、アザミウマ類、ネキリムシ類、アオムシ	6kg/10a(2g/株)	収穫開始14日前まで		作条散布		
オクラ	アブラムシ類		は種前				
だいこん	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	3～4kg/10a	収穫21日前まで		2回以内	株元散布	2回以内 (株元散布は1回以内、 散布は1回以内)
かぶ		4kg/10a	収穫75日前まで	散布			
ごぼう		3～6kg/10a	収穫14日前まで	無人航空機による散布		2回以内	
れんこん	アブラムシ類	4kg/10a	植付時	1回	作条散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、 植付後は2回以内)	
ばれいしょ		3～6kg/10a (1～2g/株)	収獲21日前まで	3回以内	生育期株元散布	3回以内	
えだまめ	ハスモンヨトウ	6kg/10a	定植時	1回	植溝土壌混和	1回	
なばな類	アブラムシ類	6kg/10a	は種時		播溝土壌混和		
花き類・観葉植物 (きく、宿根スターチス カーネーション、 アリウム、たであい を除く)	アザミウマ類、アブラムシ類	3～6kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内	
宿根スターチス	ヨトウムシ類	6kg/10a					
	コガネムシ類幼虫、ヨトウムシ類						
カーネーション	アザミウマ類、アブラムシ類	3～6kg/10a					
	コナガ、ヨトウムシ類	6kg/10a					
アリウム	ネギコガ、ヨトウムシ類	3～6kg/10a					
きく	アザミウマ類、アブラムシ類	6kg/10a					
つつじ類	ツツジゲンバイ		生育期 (樹高2m以下)	2回以内	灌水散布	2回以内	
樹木類 (つつじ類、 ポインセチアを除く)	ケムシ類	12kg/10a					
いぐさ	イグサシンムシガ	4kg/10a	生育期	2回以内	全面散布	5回以内	
芝	スジキリヨトウ、シバツトガ	10kg/10a	発生初期	5回以内	作条散布後 土壌混和	2回以内	
	タマナヤガ	5～10kg/10a					株元散布
たばこ	ヨトウムシ、ネキリムシ、アブラムシ類 アザミウマ類、ジャガイモガ、ヤサイゾウムシ	3～6kg/10a	移植前	1回	本剤の所定量を セル成型育苗トレイ またはペーパーポットの上から均一に散布する。	1回	
たであい	アブラムシ類	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (30×60cm、使用土壌 約1.5～4ℓ)当り50g	本畑初期				
		6kg/10a	定植時		株元散布		


2022年10月現在の登録内容

使用方法



オルトラは作物の根からも吸収される性質が強く、植穴処理によって作物体内にムラなく移行し各種害虫を防除します。

また、株元散布によって成分が土中の水分によって溶け出し、根から吸収されて効果を発揮します。



●ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届く所には置かない。●空袋は圃場などに放置せず、適切に処理する。

●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望めます。

アリスタライフサイエンス株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目4番1号
TEL 03-5203-9350 FAX 03-5203-9349
<https://www.arystallifescience.jp/>



最新の登録内容