

おっ、使える!!
収穫前日まで

信頼の総合殺菌剤!!

オニサイド[®]
水和剤80

りんごの病害防除に!!



黒星病



黒点病



斑点落葉病



輪紋病



褐斑病



すす点病



すす斑病



炭疽病

総合殺菌剤

アクリスタイド[®] 水和剤80

果樹・小麦・野菜に

■適用病害と使用方法(抜粋)

本資料は、2018年7月現在の登録内容に基づき作成しています。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(10a当り)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数					
りんご	黒星病	600~1000	200~700ℓ	収穫前日まで	6回以内	散布	6回以内					
	黒点病	800~1200										
	斑点落葉病 輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病	600~800										
	炭疽病	800										
	なし	赤星病 黒星病 輪紋病						600~1000	収穫3日前まで	9回以内	9回以内	
ぶどう	疫病	1000		800	収穫30日前まで		2回以内	2回以内				
	炭疽病											
	晩腐病 褐斑病 灰色かび病 べと病 枝膨病 黒とう病											
	おうとう	褐色せん孔病 灰星病 炭疽病								収穫3日前まで	5回以内	5回以内
	マルメロ	黒点病							1000	収穫14日前まで	6回以内	6回以内
小粒核果類	黒星病	800~1000	500	収穫21日前まで	3回以内	3回以内						
	すす斑病	800										
ブルーベリー	斑点病	500~1000	300~400ℓ	発芽前	4回以内	5回以内 (生育期は2回以内、 収穫終了後~ 落葉期までは3回以内)						
	すす点病 灰色かび病	500										
パイナップル	根腐萎凋病		200~700ℓ	収穫14日前まで	3回以内	3回以内						
もも	縮葉病		600	収穫7日前まで	5回以内	5回以内						
パパイヤ	炭疽病	1000		発芽前	4回以内	4回以内						
マンゴー				収穫14日前まで	3回以内	3回以内						

※上記の作物以外にも、小麦、はくさい、トマト、きゅうり、すいか、メロン、かぼちゃ、ごぼう、たまねぎ、しょうが、いちご、いんげんまめ、花き類・観葉植物、芝等に適用があります。

農薬適正使用運動

- 1.使用前にラベルや説明書をよく読んでください。
- 2.マスク・手袋など防護服を着用してください。
- 3.圃場の外に飛散・流出しないよう注意してください。
- 4.空袋は正しく処分してください。
- 5.食品と区別し、カギをかけて保管してください。
- 6.防除日誌を記帳しましょう。

- 1.使用前にはラベルをよく読んでください。
- 2.ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 3.本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

アクリスタライフサイエンス株式会社

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1
TEL 03-3547-4416 FAX 03-3547-4695
http://www.arystalifescience.jp/



最新の登録内容