

小麦に 待望の登録!!

さらに
葉枯症・黒点病にも
適用拡大

信頼の総合殺菌剤!!

オリーブサイド®

水和剤80

殺菌剤分類 M4

赤かび病(ニバーレ菌)や葉枯症
収穫時の黒変病・黒点病対策に!



赤かび病



葉枯症(北見農試 安岡原図)



黒変病



黒点病

特長





- ◆ 赤かび病（特にニバーレ菌による）に開花初期の防除で優れた効果を発揮します。
- ◆ 開花初期に散布することによって、ニバーレ菌による葉枯症の防除効果も高めることができます。
- ◆ 収穫時のいわゆる黒かび（黒変病・黒点病）の防除にもお使いいただけます。
- ◆ 病原菌に対する作用点が多岐にわたるので、耐性菌管理に有効です。
- ◆ 有効成分が植物表面に留まり、菌の侵入を防ぎます。

■適用病害と使用方法（抜粋）

本資料は、2019年9月現在の登録内容に基づき作成しています。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量（10a当り）	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数
小麦	赤かび病 葉枯症	600~1000	60~150ℓ /10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
	黒変病 黒点病	1000					

■試験成績



農薬適正使用運動

- 1.使用前にラベルや説明書をよく読んでください。
- 2.マスク・手袋など防護服を着用してください。
- 3.圃場の外に飛散・流出しないよう注意してください。
- 4.空袋は正しく処分してください。
- 5.食品と区別し、カギをかけて保管してください。
- 6.防除日誌を記載しましょう。

- 1.使用前にはラベルをよく読んでください。
- 2.ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 3.本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

アリスタライフサイエンス株式会社

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1
 TEL 03-3547-4415 FAX 03-3547-4695
<https://www.arystalifescience.jp/>

