

小麦に 待望の登録!!

黒変病
(1500倍)に
適用拡大

信頼の総合殺菌剤!!

オーソサイド®

水和剤80

殺菌剤分類 M4

赤かび病(ニバーレ菌)や葉枯症
収穫時の黒変病・黒点病対策に!



赤かび病



葉枯症(北見農試 安岡原図)



黒変病



黒点病

特長

- ◆ 赤かび病（特にニバーレ菌による）に開花初期の防除で優れた効果を発揮します。
- ◆ 開花初期に散布することによって、ニバーレ菌による葉枯症の防除効果も高めることが出来ます。
- ◆ 収穫時のいわゆる黒かび（黒変病・黒点病）の防除にもお使いいただけます。
- ◆ 病原菌に対する作用点が多岐にわたるので、耐性菌管理に有効です。
- ◆ 有効成分が植物表面に留まり、菌の侵入を防ぎます。

■ 適用病害と使用方法（抜粋）


本資料は、2022年12月現在の登録内容に基づき作成しています。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (10a当り)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	キャプタンを含む 農薬の総使用回数
小麦	赤かび病 葉枯症	600~1000	60~150ℓ /10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
	黒変病	1000~1500					
	黒点病	1000					


■ 試験成績

小麦赤かび病（ニバーレ菌優占）

十勝農試 2006年



秋まき小麦の赤かび病に対する薬剤の散布時期




オーソサイド水和剤80は開花初期の使用がお勧めです。

フザリウム菌による赤かび病及びDON汚染低減には、それらに効果の高い剤との併用でお使いください。


ニバーレ菌による小麦葉枯症

十勝農試 2015年



小麦黒変病

北植防 2017年



農薬適正使用運動

- 1.使用前にラベルや説明書をよく読んでください。
- 2.マスク・手袋など防護服を着用してください。
- 3.圃場の外に飛散・流出しないよう注意してください。
- 4.空袋は正しく処分してください。
- 5.食品と区別し、カギをかけて保管してください。
- 6.防除日誌を記帳しましょう。

- 1.使用前にはラベルをよく読んでください。
- 2.ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 3.本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

アリスタライフサイエンス株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目4番1号
 TEL 03-5203-9350 FAX 03-5203-9349
<https://www.arystalifescience.jp/>

