


捕食性天敵

農林水産省登録 第20657号

タイリク®

タイリクヒメハナカメムシ剤

アザミウマに強カパンチ!!



捕食性天敵

農林水産省登録 第24096号

ククナリス®

ククメリスカブリダニ剤

予防的導入で長く効く!!

新ボトルで
さらに
使いやすく



IPMで
アザミウマ防除



IPM (総合的病害虫管理) でアザミウマ類を防除

農林水産省登録 第20657号

捕食性天敵 **タイリク**®

タイリクヒメハナカメシ剤 250mℓ (250頭入り)

有効成分：タイリクヒメハナカメシ成虫 50頭 / 50mℓ
 性状：淡褐色細粒
 包装：250mℓポリエチレン瓶

特長

冬季の短日条件下でも有効に働くことが可能です。また春先から秋にかけての高温期の使用がより効果的です。

夜温の低下は発育に悪影響を及ぼす場合があるため、夜温管理は15℃以上が理想的です。

■ 適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	タイリクヒメハナカメシを含む農薬の総使用回数
野菜類 (施設栽培)	アザミウマ類	500~2,000mℓ / 10a (約500~2,000頭)	発生初期	—	放飼	—

農林水産省登録 第24096号

捕食性天敵 **ククメリス**®

ククメリスカブリダニ剤 1ℓ (50,000頭入り)

有効成分：ククメリスカブリダニ 500頭 / 10mℓ
 性状：淡褐色粒
 包装：1ℓポリエチレン瓶

特長

高い生存能力をもつのでアザミウマの発生前から導入・定着でき、「待ち伏せ」させておくと効果的に密度抑制します。

敷きわらやもみ殻を置き、住処にさせると定着が良くなり長期間アザミウマを効果的に抑制します。
 [また敷きわら等は液肥など水溶液散布時の天敵の流亡を防ぎます。]

施設ほうれんそうのケナガコナダニにも効果的です!

■ 適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ククメリスカブリダニを含む農薬の総使用回数
野菜類 (施設栽培)	アザミウマ類	50~100頭 / 株	発生初期	—	放飼	—
ほうれんそう (施設栽培)	ケナガコナダニ	100~200頭 / m ²				
シクラメン (施設栽培)	アザミウマ類	50~100頭 / 株				

微生物殺虫剤 **ボタニガード**® ES

ボーベリア バシアーナ乳剤

農林水産省登録 第20956号

特長

- 広範囲の害虫 (コナジラミ類・アザミウマ類・アブラムシ類・ハダニ類など) に効果のある昆虫病原性糸状菌製剤です。
- 抵抗性害虫にも優れた効果を発揮します。
- 農薬散布回数にカウントされない微生物農薬です。
- 乳剤タイプで、乾燥による影響が低減されました。

野菜類
ハダニ類に
適用拡大!!



■ 適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ボーベリア バシアーナを含む農薬の総使用回数
野菜類	アザミウマ類	500~1000倍					
キャベツ	アコ						
レタス	オ						
しそ	チマ						
トマト	コ						
ミニトマト	コ						
茶	ク						
マンゴー	チ						

最新の内容については、
製品ラベルをご確認ください。
 最新の製品ラベルはこちらをクリックしてください

農薬は正しく使いましょう ● ラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

天敵はさまざまな防除手段を組み合わせた IPM (総合的病害虫防除) の中心的な手段として最適です。

アリスタライフサイエンス株式会社
 〒104-6591 東京都中央区明石町8-1
 TEL 03-3547-4415 FAX 03-3547-4695
<http://www.arystallifescience.jp/>