

捕食性天敵

# リモニカ®

リモニカスカブリダニ剤

長い前脚で、  
害虫を掴んで、  
逃さない！



比較的低温に強い

高い捕食能力

害虫の発生前から放飼可能



スワルスキーとの  
セット放飼で  
さらに効果安定!!!

## リモスワセット

リモニカ® + スワルスキー®

セット内容：リモニカ1ℓ(1本)+スワルスキー250ml(1本)



捕食性天敵

# リモニカ®

リモニカスカブリダニ剤

10入(12,500頭入)

成分:リモニカスカブリダニ…125頭/10m<sup>2</sup>  
サトウダニ、ふすま等  
性状:淡褐色粒

## 特長

寒さに強く、  
比較的低温  
でも活動

広い捕食範囲と  
高い捕食能力

植物上での高い定着性  
〔花粉や微小生物を餌に〕  
して増殖します。

害虫の発生前から  
予防的に使用が可能

### アザミウマ類の 2齢幼虫まで捕食

アザミウマ類の生育ステージ




### コナジラミ類の 4齢幼虫まで捕食


コナジラミ類の生育ステージ




比較的低温でも  
定着し、  
防除効果を発揮



### きゅうり/アザミウマ類防除試験結果



### なす/コナジラミ類防除試験結果



### 適用害虫と使用方法

2024年10月現在の登録

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	リモニカスカブリダニを含む農薬の総使用回数
野菜類 (施設栽培)	アザミウマ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ	2~40/10a (約25000~50000頭)	発生直前 ~ 発生初期	—	放飼	—
花き類・観葉植物 (施設栽培)	アザミウマ類	20/10a (約25000頭)				

### 効果・薬害等の注意

- 本剤はアザミウマ類、コナジラミ類及びチャノホコリダニを捕食する天敵リモニカスカブリダニを含有する製剤です。
- リモニカスカブリダニの生存日数は短いので、入手後直ちに使用し、使いきってください。
- 容器内でリモニカスカブリダニが偏在していることがあるので、使用の直前に容器をゆっくり回転させ、均一に混在させた後に放飼してください。
- 害虫の生息密度が高くなってからの放飼は十分な効果が得られないことがあるので、これらの害虫の発生直前から発生初期に最初の放飼をしてください。

- 有効な天敵密度を保つため、1~2週間間隔で放飼してください。
- 放飼はできるだけ均一に行うことを原則とするが、アザミウマ類、コナジラミ類及びチャノホコリダニの発生にむらがある場合には、発生の多いところに重点的に放飼してください。
- リモニカスカブリダニの活動に影響を及ぼすおそれがあるので、本剤の使用期間中に他剤(天敵農薬を含む)を処理する場合には十分に注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

●ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届く所には置かない。●空容器はほ場などに放置せず、適切に処理する。

低温条件でも定着し、しっかりと防除!

アリスタライフサイエンス株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目4番1号  
TEL 03-5203-9350 FAX 03-5203-9349  
https://www.arystalifescience.jp/



最新の登録内容