

セレクト[®] 乳剤

® はアリスライフサイエンス株式会社の登録商標

包装：100 mℓ × 60


除草剤分類

1


スズメノカタビラ 葉齢別除草効果試験

使用薬量 セレクト乳剤：75 mℓ / 10a
A 剤：200 mℓ / 10a B 剤：300 mℓ / 10a ※試験概要は裏面を参照ください。

3 葉期処理



5 葉期処理




スズメノカタビラには、やっぱり

セレクト[®] 乳剤

アリスライフサイエンス株式会社

イヌビエ 5 葉期処理



使用薬量 セレクト乳剤：75mℓ/10a
A剤：200 mℓ/10a B剤：300 mℓ/10a

試験概要（2020年）

試験地：北海道北広島市
ホクサン株式会社農業科学研究所
試験規模：1/10,000a ポット×3 反復
対象雑草：スズメノカタビラ、イヌビエ
播種日：スズメノカタビラ 9月17日
イヌビエ 10月6日
処理月日：スズメノカタビラ
3葉期 10月6日、5葉期 10月14日
イヌビエ
5葉期 11月2日
処理方法：スプレーガン散布
散布圧 0.2MPa
散布水量 100 ℓ/10a

適用と使用方法（抜粋）

令和3年5月現在

作物名	適用雑草名	使用時期	10a 当り使用量		本剤の 使用 回数	使用方法	クレトジムを 含む農薬の 総使用回数	
			薬量	希釈 水量				
あずき	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	雑草生育期（イネ科雑草 3 ～ 5 葉期） 収穫 45 日前まで	35 ～ 50 mL	100 ℓ	1 回	雑草茎葉 散布又は 全面散布	1 回	
	スズメノカタビラ		50 ～ 75 mL					
いんげんまめ	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	雑草生育期（イネ科雑草 3 ～ 5 葉期） 収穫 60 日前まで	35 ～ 50 mL					
	スズメノカタビラ	50 ～ 75 mL						
だいず	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	雑草生育期（イネ科雑草 3 ～ 5 葉期） 収穫 50 日前まで	35 ～ 50 mL					
	スズメノカタビラ	雑草生育期（イネ科雑草 5 ～ 8 葉期） 収穫 50 日前まで	50 ～ 75 mL					
		雑草生育期（イネ科雑草 3 ～ 5 葉期） 収穫 50 日前まで						
えだまめ	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	雑草生育期（イネ科雑草 3 ～ 5 葉期） 収穫 14 日前まで	35 ～ 50 mL					
	スズメノカタビラ	雑草生育期（イネ科雑草 5 ～ 8 葉期） 収穫 14 日前まで	50 ～ 75 mL					
		雑草生育期（イネ科雑草 3 ～ 5 葉期） 収穫 14 日前まで						
かんしょ	雑草生育期（イネ科雑草 3 ～ 5 葉期） 収穫 100 日前まで	3 回 以内						3 回 以内
ばれいしょ キャベツ ねぎ だいこん かぼちゃ	雑草生育期（イネ科雑草 3 ～ 5 葉期） 収穫 30 日前まで							
たまねぎ	雑草生育期（イネ科雑草 3 ～ 5 葉期） 収穫 21 日前まで				1 回		1 回	
にんじん	雑草生育期（イネ科雑草 3 ～ 5 葉期） 収穫 40 日前まで				2 回 以内		2 回 以内	
にんにく	雑草生育期（イネ科雑草 3 ～ 5 葉期） 収穫 30 日前まで							
アスパラガス	雑草生育期（イネ科雑草 3 ～ 5 葉期） 収穫前日まで							
いぐさ	水田一年生イネ科雑草		落水後雑草生育期（イネ科雑草 3 ～ 5 葉期） （入水15日前まで）		75 mL	3 回 以内	雑草茎葉散布又は 全面散布（落水）	