

イネ科雑草専用茎葉処理除草剤

セレクト® 乳剤

®はアリスタ ライフサイエンス株式会社の登録商標

スズメノカタビラ防除、選ぶならセレクト。

スズメノカタビラ



イヌビエ



メヒシバ



特長

1 スズメノカタビラに高い効果

従来のイネ科雑草防除用茎葉処理剤では防除が困難なスズメノカタビラに対して、高い除草効果を示します。

2 一年生、多年生を問わず広範なイネ科雑草に高い効果

イヌビエ・メヒシバなどの1年生イネ科雑草からシバムギ、レッドトップなどの多年生イネ科雑草に高い除草効果を示します。

3 広葉作物や非イネ科作物に高い安全性

イネ科植物と非イネ科植物との間にきわめて高い選択性があるので、マメ類、テンサイ、タマネギなどや非イネ科作物に安心して使用できます。

適用作物・雑草と使用方法

(2024年3月現在の登録)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	クレトジムを含む農業の総使用回数
			薬量	希釈水量			
あすき	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫45日前まで	35~50mℓ/10a	100ℓ /10a	1回	雑草茎葉散布 又は 全面散布	1回
	スズメノカタビラ		50~75mℓ/10a				
いんげんまめ	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫60日前まで	35~50mℓ/10a				
	スズメノカタビラ		50~75mℓ/10a				
だいず	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫50日前まで	35~50mℓ/10a				
		雑草生育期(イネ科雑草5~8葉期) 収穫50日前まで	50~75mℓ/10a				
	スズメノカタビラ	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫50日前まで					
えだまめ	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫14日前まで	35~50mℓ/10a				
		雑草生育期(イネ科雑草5~8葉期) 収穫14日前まで	50~75mℓ/10a				
	スズメノカタビラ	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫14日前まで					
てんさい	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫30日前まで	35~50mℓ/10a				
		雑草生育期(イネ科雑草5~8葉期) 収穫30日前まで	2回以内				
	シバムギ、レッドトップ、スズメノカタビラ	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫30日前まで					
かんしょ	一年生イネ科雑草	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫100日前まで	50~75mℓ/10a	1回	雑草茎葉散布 又は 全面散布	2回以内	
ばれいしよつぎ、ねだかまわり(種子)		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫30日前まで					
たまねぎ		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫21日前まで	3回以内	3回以内			
		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫40日前まで					
にんじん		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫30日前まで	1回	1回			
にんにく		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫30日前まで	2回以内	2回以内			
アスパラガス		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫前日まで					
おうぎ		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫30日前まで	4回以内 (1年間に2回以内)	4回以内 (1年間に2回以内)			
とうき		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫30日前まで	6回以内 (1年間に2回以内)	6回以内 (1年間に2回以内)			
かのこそう		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫45日前まで	1回	1回			
だいおう	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫14日前まで	15回以内 (1年間に3回以内)	15回以内 (1年間に3回以内)				
甘草		9回以内 (1年間に3回以内)	9回以内 (1年間に3回以内)				
いぐさ	水田一年生イネ科雑草	落水後雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) (入水15日前まで)	75mℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布又は 全面散布(落水)	3回以内	

散布 タイミング


この時期が散布適期です!!



セレクト乳剤散布



広葉作物は枯れずに、イネ科雑草だけ枯らします!



使用上の注意事項(抜粋)

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液の調製に当たっては、使用の直前に本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから使用してください。
- イネ科雑草優占のほ場で使用してください。広葉雑草およびカヤツリグサ科雑草などが混在する場合には、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。
- 展着剤を加用するとより一層効果的です。
- イネ科雑草の生育期に有効であるが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、時期を逸さないように均一に散布してください。

- 雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないように均一に散布してください。
- やや遅効性であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに通常1週間から2週間前後を要するが、スズメノカタビラに対してはさらに期間を要する場合がありますので、誤ってまき直しなどしないように注意してください。
- イネ科作物には薬害をおこすおそれがあるので、周囲にイネ科作物がある場合は、薬剤が飛散しないように注意してください。
- 激しい降雨の予想される場合は使用をさけてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。● 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。● 防除日誌を記帳しましょう。



最新の登録内容

アリスタライフサイエンス株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目4番1号

TEL.03-5203-9350

<https://www.arystallifescience.jp/>