

選ばれて、使われて。長年の実績が信頼の証。

# トクチオン<sup>®</sup> 乳剤

殺虫剤分類 1B

®はアリスタ ライフサイエンス(株)の登録商標です。

アザミウマ類、ネダニ類、  
ハダニ類などの難防除害虫に



**ねぎに  
適用拡大!**

## トクチオン乳剤の特長

- 野菜、果樹、茶、花き類などに発生する多くのチョウ目害虫(ハマキムシ類、コナガ、ヨトウムシなど)、アブラムシ類、コナカイガラムシ類、アザミウマ類、ハダニ類に優れた殺虫力を持つ、まさに農家の常備薬です。
- 接触毒と食毒の作用を持ち、効果の発現はやや遅効的ですが、優れた殺虫力を発揮し、比較的残効性のある薬剤です。



ネダニ



ネギアザミウマ



ミカンキイロアザミウマ



ツメクサガ



ハリガネムシ類



ハダニ

## 適用害虫および使用方法

(2020年4月現在の登録)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロチオホスを含む農薬の総使用回数			
みかん	コカクモンハマキ、フラーバラソウムシ	1000倍	200~700ℓ /10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内			
	フジコナカイガラムシ	1000~1500倍		収穫60日前まで	5回以内		5回以内			
なし	コナカイガラムシ類、ハマキムシ類	1000倍		収穫75日前まで	2回以内		2回以内			
かき	カキノヘタムシガ フジコナカイガラムシ、マイマイガ アザミウマ類、ハマキムシ類			裂果前まで (但し収穫7日前まで)	5回以内		5回以内			
くり	モモノゴマダラノメイガ ネスジキノカワガ			100~300ℓ /10a	収穫21日前まで		2回以内	2回以内		
キャベツ	コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ アオムシ、ウツバ類、アブラムシ類			25ℓ /10a	収穫7日前まで		4回以内	4回以内		
たまねぎ	アザミウマ類	300倍		100~300ℓ /10a	収穫14日前まで		3回以内	3回以内		
にんにく	ネギコガ、チュールリップサビダニ	1000倍							収穫21日前まで	2回以内
ばれいしょ	ジャガイモガ、ヨトウムシ アブラムシ類				1000~2000倍		収穫30日前まで	3回以内		
かんしょ	ハスモンヨトウ								1000~1500倍	
あずき	ナカジロシタバ、ハダニ類		1000倍		1回	1回				
だいず	アズキノメイガ、ツメクサガ、ハダニ類	1000~1500倍	200~400ℓ /10a				2回以内	2回以内		
てんさい	マメシクイガ、ハダニ類	1000倍			1.8ℓ /m <sup>2</sup>	2回以内			2回以内 (土壌混和は1回以内)	
茶	シロイチモジマダラメイガ ハスモンヨトウ、アブラムシ類 ツメクサガ、カメムシ類	1000倍	100~300ℓ /10a				1回	1回		
さとうきび	アオドウガネ ハリガネムシ類	1000倍			100~300ℓ /10a	3回以内			3回以内	
ねぎ	アザミウマ類	2000倍	3ℓ /m <sup>2</sup>				1回	2回以内 (土壌混和は1回以内、 株元灌注は1回以内)		
にら	ネダニ類	1000倍		200~700ℓ /10a	発生初期	5回以内				
らっきょう	アザミウマ類		1000倍				200~700ℓ /10a	発生初期	5回以内	
いちご	ハダニ類 キンケクチプトソウムシ成虫	1000倍		200~700ℓ /10a	発生初期	5回以内				
花き類・観葉植物 (ばら、さく、 プリムラ、シクラメン ペゴニア、 宿根かすみそうを除く)	アザミウマ類 ハダニ類		1000倍				200~700ℓ /10a	発生初期	5回以内	
ばら	アブラムシ類、フラーバラソウムシ アザミウマ類、ハダニ類	1000倍		200~700ℓ /10a	発生初期	5回以内				
きく	キンケクチプトソウムシ成虫 アザミウマ類、ハダニ類		1000倍				200~700ℓ /10a	発生初期	5回以内	
プリムラ シクラメン ペゴニア	ヨトウムシ、ナスハモグリバエ アザミウマ類、ハダニ類	1000倍		200~700ℓ /10a	発生初期	5回以内				
宿根かすみそう	ヨトウムシ、ナスハモグリバエ アザミウマ類、ハダニ類		1000倍				200~700ℓ /10a	発生初期	5回以内	
樹木類 (つばき類、さくら、 プラタナスを除く)	フラーバラソウムシ	1000倍		200~700ℓ /10a	発生初期	5回以内				
つばき類	チャドクガ、フラーバラソウムシ		1000倍				200~700ℓ /10a	発生初期	5回以内	
さくら プラタナス	アメリカシロヒトリ フラーバラソウムシ	1000倍		200~700ℓ /10a	発生初期	5回以内				
たばこ	タバコアオムシ、ヨトウムシ アブラムシ類、ジャガイモガ アザミウマ類		25~180ℓ /10a				2回以内	2回以内		
芝	シバツツガ	0.5~1ℓ /m <sup>2</sup>	発生初期	3回以内	5回以内					

### 安全使用上の注意(抜粋)

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。● ミツバチに注意して使用してください。● 眼に入らないよう注意してください。
- 皮膚に付着しないよう注意して使用してください。● 火気には十分に注意してください。
- 解毒剤…動物実験で硫酸アトロピン製剤が有効だと報告されています。
- 魚毒性等…水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。● 空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
- 冬場に保管すると容器の底部に沈降物が認められる場合があります。そのような場合には、使用前に容器を逆さまにしてボトルを十数秒程度振っていただく均一に分散し、効果・物理性共に問題なくご使用いただけます。



最新の登録内容

アスタライフサイエンス株式会社  
〒104-6591 東京都中央区明石町8-1  
TEL.03-3547-4415 FAX.03-3547-4695  
<https://www.arystallifescience.jp/>