

芝を守る殺菌剤

ターフシャーク[®]

芝用殺菌剤

芝の赤焼病、ピシウム病に!!



特長

ビシウム菌による病害に即効的
に高い防除効果を示します。

病原菌の感染・侵入の阻止
(予防効果)のみならず、感染
後すぐであれば、治療効果も
示します。

根部からも吸収され、茎葉部
に浸透移行して地上部でも
効果を発揮します。

適度な土壌吸着があるので、
流亡が比較的に少ない薬剤です。

液剤ですので調製しやすく、
芝に対する汚れもありません。

適用病害と使用方法

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	プロバモカルブ 塩酸塩を含む 農薬の総使用回数
西洋芝 (ペントグラス)	赤焼病	400～ 600倍	1ℓ/m ²	発病初期	8回以内	散布	8回以内
	ビシウム病	500倍	0.5ℓ/m ²				

効果試験例

赤焼病に対する防除効果

平成19年 新中国グリーン研究所(山口県周南市)		
草種：ペントグラス	品種：ベंकクロス	防除率(%)
無処理	0.0	
ターフシャワー (500倍 0.5ℓ/m ²)		99.7
A液剤 (300倍 1ℓ/m ²)		99.5

ビシウム病に対する防除効果

平成21年 東日本グリーン研究所(神奈川県横浜市)		
草種：ペントグラス	品種：ベンA1	防除率(%)
無処理	0.0	
ターフシャワー (500倍 0.5ℓ/m ²)		100
A液剤 (300倍 1ℓ/m ²)		100

⚠ 効果・被害等の注意

- うり科野菜・豆類、なすには薬害を生じるおそれがあるので、周辺にそれらの作物がある場合にはかららないように注意すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用の場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意

- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
● 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

製造： **アリスライフサイエンス株式会社**
〒104-6591 東京都中央区明石町8-1
TEL 03-3547-4416 FAX 03-3547-4695

販売： **東洋グリーン株式会社**
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-33-8
TEL 03-3249-7731 FAX 03-3249-7781
ホームページ <http://www.toyo-green.com/> お問い合わせ info@toyo-green.com