

表示変更ラベル

農林水産省登録 第20231号

殺菌剤

サルバトーレME

テトラコナゾール液剤

登録変更日 平成18年2月22日

本製品製造後に、「ミニトマト」への適用拡大、ならびに「りんご」「なし」「きゅうり」「トマト」「いちご」「かぼちゃ」の使用用量に変更がありましたので、この表示変更ラベルにてご確認下さい。

(下線部分に変更になりました)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テトラコナゾールを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病 赤星病 うどんこ病 モニリア病	3000 倍	200~700 <u>ℓ/10a</u>	収穫 45 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
なし	黒星病 赤星病			収穫 21 日前まで			
きゅうり	うどんこ病 黒星病		100~300 <u>ℓ/10a</u>				
ミニトマト	葉かび病	3000 倍	100~400 <u>ℓ/10a</u>	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
トマト		2000~ 3000 倍	100~300 <u>ℓ/10a</u>		3 回以内		3 回以内
いちご	うどんこ病			32 倍		1.6ℓ/10a	
かぼちゃ							
茶	炭疽病 もち病 褐色円星病	2000 倍	200~400 <u>ℓ/10a</u>	摘採 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
ばら	うどんこ病 黒星病	3000 倍	150~300 <u>ℓ/10a</u>	発病初期	7 回以内		7 回以内
きく	白さび病	2000 倍	150~400 <u>ℓ/10a</u>				
たばこ	うどんこ病	3000~ 4000 倍	100~180 <u>ℓ/10a</u>	収穫 10 日前まで	2 回以内		2 回以内

効果・薬害等の注意(追加)

ミニトマトに使用する場合には、高温、多湿等の条件下では薬害を生じる場合があるので注意すること。

その他の使用上の注意事項などについては、製品に添付されているラベルを参照願います。

アリスタ ライフサイエンス株式会社