

平成19年7月4日

各 位

東京都中央区新川2-27-1
住友化学株式会社

東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー38階
アリスタライフサイエンス株式会社

サルバトールME適用拡大について（ご連絡）

拝啓、盛夏の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平素より普及推進にご尽力戴いております弊社殺菌剤サルバトールMEの適用拡大につきまして、取り急ぎご案内申し上げます。

殺菌剤サルバトールMEは7月4日付けで別紙の通り「ももの黒星病、灰星病」に適用拡大となりました。今後とも、皆様の多大なるご支援とご協力をお願いいたします。

敬具

変更後の適用病害虫の範囲および使用方法

| 作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | テトラコナゾールを含む農薬の使用回数 |
|------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------|------|--------------------|
| りんご | 黒星病 赤星病 うどんこ病 モニリア病 | 3000 倍 | 200-700 L/10a | 収穫 45 日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| なし | 黒星病 赤星病 | | | 収穫 21 日前まで | | | |
| かぼちゃ | うどんこ病 | 2000 ～ 3000 倍 32 倍 | 300 L/10a 1.6L/10a | 収穫前日 まで | | | |
| ばら | うどんこ病 黒星病 | 3000 倍 | 150 -300 L/10a | 発病初期 | 7回以内 | 散布 | 7回以内 |
| きく | 白さび病 | 2000 倍 | 150 - 400 L/10a | | | | |
| たばこ | うどんこ病 | 3000 ～ 4000 倍 | 100- 180 L/10a | 収穫 10 日前まで | 2回以内 | | 2回以内 |
| もも | 黒星病 灰星病 | 2000 倍 | 200～700L/10a | 収穫前日 まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |