



Arysta LifeScience

P.O.BOX 51 TOKYO 104-6591 JAPAN

アリスタ ライフサイエンス 株式会社 〒104-6591 東京都中央区明石町8-1(私書箱51号)

2007年9月26日

お客様各位

アリスタライフサイエンス株式会社
日本事業部

微生物殺菌剤「TMボトキラー®水和剤」の適用拡大のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平素より普及推進にご尽力をいただいております弊社微生物殺菌剤「TMボトキラー®水和剤」の適用拡大に付きまして、FAXにて失礼かとは存じますが、取り急ぎご案内申し上げます。

微生物殺菌剤「TMボトキラー®水和剤」は9月19日付けで別紙の通り、

- ① 「ダクト内投入」において、作物名「シクラメン」を、作物名「花き類・観葉植物」に追加変更。
- ② 「ダクト内投入」において、作物名「いちご」、適用病害虫名「うどんこ病」を追加し、「野菜類」に含まれる作物名を整理

し、適用拡大になりました（網掛け太字部分）。

今後とも、皆様の多大なるご支援とご協力をお願い申し上げます。また、ご注文につきましては、従来と同様月曜日から金曜日までの毎日承ります。

敬具

別紙 1

変更前

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バチルスズブチリスを含む農薬の総使用回数
野菜類	灰色かび病	1000倍	150～300 l/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
	うどんこ病						
ぶどう	灰色かび病		200～700 l/10a	開花期～ 幼果期			
かんきつ							
なし							

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バチルスズブチリスを含む農薬の総使用回数
野菜類	灰色かび病	300g/10 a	6～10 l/10a	発病前～ 発病初期	—	常温 煙霧	—

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バチルスズブチリスを含む農薬の総使用回数
野菜類	灰色かび病	10～15g/10a/日	発病前～ 発病初期	—	ダクト 内投入	—
シクラ メン						

別紙2

変更後

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バチルスズブチリスを含む農薬の総使用回数
野菜類	灰色かび病	1000倍	150～300 l/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
	うどんこ病						
ぶどう	灰色かび病		200～700 l/10a	開花期～ 幼果期			
かんきつ							
なし							

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バチルスズブチリスを含む農薬の総使用回数
野菜類	灰色かび病	300g/10 a	6～10 l/10a	発病前～ 発病初期	—	常温 煙霧	—

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バチルスズブチリスを含む農薬の総使用回数
野菜類(いちごを除く)	灰色かび病	10～15g/10a/日	発病前～ 発病初期	—	ダクト 内投入	—
花き類・観葉植物						
いちご	うどんこ病	15g/10a/日				

以上