

平成 20 年 2 月 6 日

お客様各位

アリスタ ライフサイエンス株式会社
日本事業部**「オルトラン®水和剤」適用拡大のお知らせ**

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社取扱い商品であります化学殺虫剤「オルトラン水和剤(登録番号:第 19992 号)」が 2008 年 2 月 6 日付けで適用拡大致しましたので、ご連絡いたします。適用拡大内容は以下の通りです。

使用者様及びお取扱各位への周知徹底についてご協力を賜りたく宜しくお願い申し上げます。

変更内容: 作物名「葉しょうが」、適用害虫名「アワノメイガ」を追加

敬具

適用病害虫の範囲および使用方法 〈葉しょうが抜粋〉

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
葉しょうが	アワノメイガ	1000 倍	収穫 21 日前まで	2回以内	散布	2回以内

オルトラン水和剤（アセフェート水和剤）

農林水産省登録番号：第 19992 号

最終登録変更日：2008 年 2 月 6 日

適用病害虫の範囲および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
なす	アブラムシ類、アザミヤカ類	1000～2000 倍	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
	ハモンヨトウ、オオタバコガ	1000 倍				
キャベツ	ヨウムシ、ハモンヨトウ、タマキシンウバ	1000～1500 倍	収穫 14 日前まで			
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1000～2000 倍				
はくさい	カブラハバチ、ヨウムシ、ハモンヨトウ	1000～1500 倍	収穫 14 日前まで			
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1000～2000 倍				
レタス	ヨウムシ	1000～1500 倍	収穫 21 日前まで			
	オオタバコガ	1000 倍				
非結球レタス	ヨウムシ	1000～1500 倍	収穫 21 日前まで			
オオタバコガ	1000 倍					
ブロッコリー カリフラワー	ヨウムシ	1000 倍	収穫 14 日前まで	2 回以内	2 回以内 (は種前及びは種時の処理は合計 1 回以内)	
だいこん	ヨウムシ、カブラハバチ、ダイコンシクイムシ	1500 倍				
はつかだいこん	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1500～2000 倍	収穫 14 日前まで	2 回以内	2 回以内 (は種前の処理は 1 回以内)	
	ヨウムシ、カブラハバチ、ダイコンシクイムシ	1500 倍				
非結球あぶらな 科葉菜類 (ケール、からしな、みずな、 ルッコラを除く)	アブラムシ類	1500 倍	収穫 21 日前まで	1 回	1 回	
	かぶ					アブラムシ類、アオムシ、コガ
葉しょうが	アヲメカ	1000 倍	収穫 45 日前まで	2 回以内	2 回以内	
しょうが						



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゼートを含む農薬の総使用回数
ごぼう	アブラムシ類	1000 倍	収穫 45 日前まで	1 回	散布	2 回以内 (株元散布は 1 回以内、散布 は 1 回以内)
オクラ	アブラムシ類、ミドリコバエ		1 回			
ばれいしょ	テントウムシダマシ幼虫、ヨウムシ	1000~1500 倍	収穫 7 日前まで	4 回以内	10a 当り 250 散布	5 回以内 (植付時の処理 は 1 回以内、 植付後は 4 回以内)
	アブラムシ類、ジャガイガ					
	アブラムシ類	300 倍				
てんさい	ヨウムシ、テンサバグリアバエ	1000~1500 倍	収穫 45 日前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗期の 灌注は 1 回以内、 散布は 3 回以内)
	トビハムシ類	1000 倍				
	ヨウムシ	16 倍				
		300 倍				
	トビハムシ類	60~100 倍	育苗期	1 回	1 m ² 当り 2.5~30 灌 注	
トマト	アブラムシ類	1000~2000 倍	収穫前日まで	3 回以内		3 回以内
	マメハダグリアバエ	1000 倍				
ミニトマト	アブラムシ類	1500 倍	収穫 14 日前まで	1 回	散布	2 回以内 (定植時の 処理は 1 回以内、 定植後は 1 回以内)
とうもろこし		1000 倍	収穫 7 日前まで	2 回以内		2 回以内
あずき			収穫 14 日前まで	3 回以内		3 回以内
だいず	ハモンヨトウ、マシクガ、アブラムシ類	16 倍	収穫 60 日前まで		10a 当り 1.60 無人ヘリコプター散布	
	アブラムシ類					



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゼートを含む農薬の総使用回数
えだまめ	ハモン幼虫、アブラムシ類	1000 倍	収穫 21 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
いんげんまめ	アブラムシ類		収穫 14 日前まで			
たまねぎ	ネギアザミ	1000~1500 倍	収穫 21 日前まで	5 回以内	10a 当り 25%散布 10a 当り 1.6ℓ 無人ヘリコプター散布	5 回以内
		300 倍				
		16 倍				
にんにく	ネギカガ、アブラムシ類	1000 倍	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
ぶどう	チャキイアザミ、フタトヒメコバ	1500~2000 倍	収穫 30 日前まで			
	ハマキムシ類	1500 倍				
かき	ネギカガアザミ チャキイアザミ、ネギハナムカ	1000~1500 倍	収穫 45 日前 まで			
	ネギヒメコバ	1000 倍				
かんきつ	コカモノハシ、シヤトリムシ類 ヤノ初代アザミ第 1 世代、ツノムシ ルビノムシ、シキイアザミ ネギアザミ、ゴボウノミトヒメコバ	1000 倍	収穫 30 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
	アブラムシ類、ケキス類 コオナメグリ、アザミ類	1000~1500 倍				
	シヤトゲコバ	1500~2000 倍				
いちじく	アザミ類	2000 倍	収穫 45 日前まで	1 回	散布	1 回
茶	チャキイアザミ、チャノトヒメコバ	1000~2000 倍	摘採 30 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
	チャノコカモノハシ	1000~1500 倍				
さんしょう (果実)	チャキイアザミ	1500 倍	収穫 14 日前まで	1 回	散布	1 回
だいおう	ヨウムシ	1000 倍	生育期 但し、収穫 230 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
みしまさいこ			収穫 30 日前まで			
薬用こんじん	アブラムシ類	1500 倍	収穫 180 日前ま で	5 回以内	散布	5 回以内
ソルガム			収穫 30 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
やまのいも	ヤマノモカ	1000 倍	収穫 45 日前ま で	1 回	散布	1 回
たばこ	ヨウムシ、タバコオシ、アブラムシ類	1500~2500 倍	収穫 10 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
	ネギアザミ	1000~2000 倍	苗床期			
	ジヤカガ若齢幼虫 ジヤカガ中齢幼虫	1500~2000 倍	収穫 10 日前まで			

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゼートを含む農薬の総使用回数
つつじ類	ツツジグンバイ	1500 倍	発生初期	5 回以内	散布	5 回以内
つばき類	チャドカス					
さくら	モンクシヤチホ	1000~1500 倍				
	アマガシロヒトリ	1500~2000 倍				
花き類 ・観葉植物	アザミヤカ類、アブラムシ類	1000~1500 倍				
	アオムシ、ヨトウムシ類	1000 倍				
きく	マカモグリバエ、オオカバコガ					
ストック	コガ、ハマダラメカガ					
宿根アスター	ヨメシジハモグリバエ					
オンシジウム	カバラムシ類					
カーネーション	コガ					
ひまわり	カコガ					
斑入りアマドコロ リアトリス	ハマキムシ類					
樹木類	アザミヤカ類					
グラジオラス						
芝	シバツカ、タナヤカ	1000 倍	植付時	1 回	10 分間球根浸漬	5 回以内
	ズグキヨトウ、ケシバオゾウムシ成虫				1 m ² 当り 0.25~2ℓ 散布	
	アカフツツリガ		発生初期	5 回以内	1 m ² 当り 1~2ℓ 散布	
					1 m ² 当り 2ℓ 散布	
もりあざみ	アブラムシ類	1500 倍	収穫 45 日前まで	1 回	散布	1 回
まめ科牧草		1000 倍		3 回以内		3 回以内

お問い合わせ先: アリスタ ライフサイエンス株式会社 日本事業部 普及推進部 (Tel:03-3547-4416)