

平成 20 年 9 月 12 日

お客様各位

アリスタ ライフサイエンス株式会社  
マーケティング・開発本部

## 「バイオセーフ」適用拡大のお知らせ

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社取扱い商品の天敵線虫殺虫剤「バイオセーフ(登録番号:第 21503 号)」が 2008 年 9 月 10 日付けで適用拡大致しましたので、ご案内申し上げます。

**適用拡大内容(別紙網掛け部参照)**

■作物名「オリーブ(葉)」の適用病害虫名「オリーブアナアキゾウムシ幼虫」を追加

使用者様及びお取扱各位への周知徹底について、ご協力を賜りたく宜しくお願い申し上げます。

敬具



別紙

【適用害虫と使用方法】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スタイナーネマカーポカプサイエを含む農薬の総使用回数
芝	シバオサゾウムシ幼虫 タマナヤガ	2億5000万頭 (約100g)/10a	500~ 2000ℓ /10a	発生初期	-	散布	-
かんしょ (茎葉)	ハスモンヨトウ			老令幼虫 発生期		土壌灌注	
かんしょ	アリモドキゾウムシ イモゾウムシ			成虫発生初期		散布	
野菜類(かんしょ(茎葉)を除く)	ハスモンヨトウ			老令幼虫発生 期		土壌灌注	
豆類(種実)							
いも類							
果樹類	モモンクイガ			夏繭が形成される時期~羽化脱出前まで			

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スタイナーネマカーポカプサイエを含む農薬の総使用回数
もも	コスカシバ	2500万頭 (約10g)	25ℓ	幼虫発生期	-	虫糞が見られる所を中心に主幹部全体に散布	-
おうとう						木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで散布または樹幹注入	
なし	ヒメホク外ウ					被害部を中心に薬液が滴るまで散布	
たらのき	センカミキリ幼虫					主幹及び主枝の産卵箇所に薬液が滴るまで塗布又は散布	
いちじく	キボンカミキリ幼虫					産卵期~幼虫喰入期	
ヤシ	ヤシオオサゾウムシ幼虫	7500万頭 (約30g)	25ℓ	幼虫発生期		樹頂部に散布	
オリーブ	オリーブアナアキゾウムシ 幼虫	2500万頭 (約10g)	50ℓ	幼虫発生期	-	樹幹部に薬液が滴るまで散布	-
オリーブ(葉)							
花き類・観葉植物	キンケクチフトゾウムシ幼虫		70~140ℓ	幼虫発生初期		1株当り300mℓ 株元灌注	

お問い合わせ先: アリスタ ライフサイエンス株式会社 マーケティング・開発本部 (TEL:03-3547-4415)