



Arysta LifeScience

平成 19 年 7 月 4 日

各 位

アリスタ ライフサイエンス株式会社
日本事業部

「オーソサイド水和剤 80」適用拡大のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社殺菌剤『オーソサイド水和剤 80』の適用拡大につきまして、ご案内申し上げます。
適用拡大内容は以下の通りとなります。

作物名「かき」の適用病害虫名「落葉病」及び「炭疽病」を追加。

作物名「はくさい」に適用病害虫名「べと病」を追加、作物名「トマト」に適用病害虫名「灰色かび病」を追加、作物名「メロン」に適用病害虫名「つる枯病」を追加、作物名「未成熟とうもろこし」の適用病害虫名「ピシウム・リゾグニア菌による病害(苗立枯病等)」使用方法「種子処理機による種子粉衣」を追加。

作物名「花き類・観葉植物」に含まれる作物を整理し、作物名「花き類・観葉植物(ばら、りんどう、せんいちこう、コスモス、ひまわり、シネリア、スイピー、みやこわすれ、アンズリウム、斑入りアマトコロを除く)」と「ばら」「りんどう」「せんいちこう」「コスモス」「ひまわり」「シネリア」「スイピー」「みやこわすれ」「アンズリウム」及び「斑入りアマトコロ」に分ける。”

今後とも、皆様の多大なるご支援とご協力をお願い申し上げます。



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	
はくさい	黒斑病、白斑病、苗立枯病	600～1200倍	収穫7日前まで	5回以内	散布	
	べと病	600倍				
トマト	疫病	800～1200倍	収穫前日まで			
	葉かび病、灰色かび病	800倍				
メロン	べと病、つる枯病	600倍	収穫前14日前まで			
	炭疽病	400～800倍				
かき	落葉、炭疽病	1000倍	収穫7日前まで			5回以内
花き類・観葉植物 (ばら、りんどう、せんにちこう、コスモス、ひまわり、シネリア、スイートピー、みやこわすれ、アンスリウム、斑入りアマドコロを除く)	茎腐病、立枯病、苗立枯病	600倍	—			—
ばら	黒点病	800倍				
りんどう	茎腐病、立枯病、苗立枯病	600倍				
	葉枯病、茎腐病、立枯病 苗立枯病					
せんにちこう	斑葉病、茎腐病、立枯病 苗立枯病					
コスモス	そうか病、茎腐病、立枯病 苗立枯病					
ひまわり	べと病、黒斑病、茎腐病 立枯病、苗立枯病					
シネリア	褐斑病、茎腐病、立枯病 苗立枯病					
スイートピー	腰折病、茎腐病、立枯病 苗立枯病					
みやこわすれ アンスリウム	根腐病、茎腐病、立枯病 苗立枯病					
斑入りアマドコロ	斑点病、茎腐病、立枯病 苗立枯病					



Arysta LifeScience

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
未成熟とうもろこし	ピシウム・リゾクニア菌による病害（苗立枯病）	種子重量の0.2～0.4%	は種前	1回	種子処理機による種子粉衣