

芝の葉枯病、 ダラースポット病に！

IPM
総合管理
INTEGRATED PEST MANAGEMENT
TOYO GREEN

イタリア生まれのシャープな効果！

テイクオールパッチに
適用拡大！



立枯病

テイクオールパッチに侵されている芝

芝用殺菌剤

ダラースポット

〔新規EBI剤〕

ボンジョルノ[®]乳剤

有効成分：テトラコナゾール25.0%

農林水産省登録第20020号



東洋グリーン株式会社

ボンジョルノは優れた予防効果・治療効果・ 浸透移行性により、ダラー・葉枯をよく抑えます!

【適用病害と使用方法】

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	散布量	使用時期	本剤及びテトラコナゾール を含む農薬の総使用回数	使用方法
芝	コウライシバ	4,000	0.5ℓ/m ²	発病初期	6回以内	散布
	ヘルミントスポリウム葉枯病 カーブラリア葉枯病					
	ヘルミントスポリウム葉枯病 カーブラリア葉枯病 ダラースポット病 立枯病(テイクオールパッチ)	2,000	1ℓ/m ²			

●試験成績

1.葉枯病に対する防除効果

(平成6年、東日本グリーン研究所)

品種：ペンクロスベントグラス

発生状況：多発性

散布：5/19、5/26

調査：6/1

供試薬剤	希釈倍数 (倍)	散布量 (ℓ/m ²)	病斑面積率(%)	防除値
ボンジョルノ	4000	0.5	0	100
Aフロアブル	500	1.0	5.0	75.6
無処理	—	—	26.7	—

※ヘルミントスポリウム菌とカーブラリア菌が混生発生

2.ダラースポット病に対する防除効果

(平成7年、日本植物防疫協会宮崎試験農場)

品種：ペンクロスベントグラス

発生状況：多発性

散布：9/26、10/3

調査：10/23

供試薬剤	希釈倍数 (倍)	散布量 (ℓ/m ²)	病斑面積率(%)	防除値
ボンジョルノ	4000	0.5	0	100
B乳剤	1000	1.0	7.3	83.1
無処理	—	—	43.3	—

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 火気を避け、直射日光のあたらない鍵のかかる低温な場所に食品と区別して密栓してください。

農業適正 使用運動

- 使用前にラベルや説明書をよく読んでください。
- マスク・手袋など防護具を着用してください。
- 農場の外に飛散・流出しないよう使用してください。
- 空容器は正しく処分してください。
- 食品と区別し、カギをかけて保管してください。

農業工業会

農業は正しく使いましょう1.使用前にはラベルをよく読んでください。2.ラベルの記載以外には使用しないでください。3.本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

このカタログの記載内容は平成12年4月1日現在のものです。



東洋グリーン株式会社

本社 東京都中央区日本橋人形町2-33-8 (人形町ビル7階)

本社 TEL (03) 3249-7731(代) FAX (03) 3249-7781

大阪支店 TEL (078) 903-6776(代) FAX (078) 903-6811

土浦営業所 TEL (0298) 31-6700 FAX (0298) 31-6699

御殿場営業所 TEL (0550) 82-5186 FAX (0550) 83-2590

名古屋営業所 TEL (052) 505-3611(代) FAX (052) 505-3615

九州営業所 TEL (0942) 43-7234 FAX (0942) 43-7297

静岡センター TEL (029) 285-5924 FAX (029) 285-5960