

平成 23 年 10 月 12 日

お客様各位

アリスタ ライフサイエンス株式会社
日本事業本部

「オーソサイド[®]水和剤 80」登録内容変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社殺菌剤「オーソサイド[®]水和剤 80（登録番号：第 21292 号）」におきまして、2011 年 10 月 12 日付けで登録内容が以下の通り変更されましたのでご連絡申し上げます。

変更後の適用病害虫の範囲および使用方法は別紙に示します。

使用者様及びお取扱各位への周知徹底についてご協力を賜りたく何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

【変更内容】

- 作物名「セルリー」を削除する。

【お問い合わせ先】

アリスタ ライフサイエンス株式会社 日本事業本部 (TEL:03-3547-4416)



(別紙)

■オーソサイド[®]水和剤 80 【変更後の適用病害虫の範囲および使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャブタンを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病	600~1000倍	200~700ℓ/10a	収穫14日前まで	6回以内	散布	6回以内
	黒点病	800~1200倍					
	斑点落葉病 輪紋病、褐斑病 すす点病、すす斑病	600~800倍					
	炭疽病	800倍					
なし	赤星病、黒星病 輪紋病	600~1000倍		収穫3日前まで	9回以内		9回以内
	疫病	1000倍					
	炭疽病	800倍					
かき	落葉病、炭疽病 すす点病	1000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内
ぶどう	晩腐病、褐斑病、 灰色かび病、べと病、 枝膨病、黒とう病	800倍		収穫45日前まで	2回以内		2回以内
おうとう	せん孔病 灰星病、炭疽病			収穫14日前まで	5回以内		5回以内
マルメロ	黒点病	1000倍		6回以内	6回以内		
小粒核果類	黒星病	800~1000倍	収穫21日前まで	3回以内	3回以内		
	すす斑症	800倍		2回以内	2回以内		
ブルーベリー	斑点病	500~1000倍					
	すす点病	500倍					
もも	縮葉病	600倍	発芽前	4回以内	4回以内		
マンゴー	炭疽病	600倍	収穫7日前まで	3回以内	3回以内		
パパイヤ			収穫14日前まで				
パイナップル	根腐萎凋病	500倍	300~400ℓ/10a				
はくさい	黒斑病、白斑病 苗立枯病	600~1200倍	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内	6回以内 (種子粉衣は 1回以内、は種 後は5回以内)	
	べと病	600倍					
トマト	疫病	800~1200倍		収穫前日まで			5回以内 (種子粉衣は 1回以内)
	葉かび病 灰色かび病	800倍					
きゅうり	炭疽病、褐斑病	600~800倍		収穫14日前まで			5回以内 (種子粉衣は 1回以内)
	べと病	600倍					
すいか	べと病、つる枯病			収穫14日前まで			5回以内 (種子粉衣は 1回以内)
メロン	炭疽病	400~800倍					
しろうり	べと病	600倍		収穫前日まで			6回以内 (種子粉衣は 1回以内、は種 後は5回以内)
かぼちゃ	炭疽病	400~800倍					
たまねぎ	灰色かび病 白色疫病 苗立枯病	600倍	収穫7日前まで				
葉たまねぎ							



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャブタンを含む農薬の総使用回数
いちご	灰色かび病 炭疽病、芽枯病	800倍	100～300ℓ/10a	収穫30日前まで	3回以内	散 布	3回以内
ごぼう	黒斑病			収穫14日前まで	5回以内		6回以内 (種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内)
いんげんまめ	炭疽病	600～1200倍		収穫30日前まで	2回以内		3回以内 (種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)
花き類・観葉植物(ばら、りんどう、せんにちこう、コスモス、ひまわり、シネリア、スイトピー、みやこわすれ、アンスリウム、斑入りアマドコロを除く)	茎腐病 立枯病 苗立枯病	600倍		—	8回以内		8回以内
ばら	黒星病	800倍					
	茎腐病、立枯病 苗立枯病	600倍					
りんどう	葉枯病、茎腐病、立枯病、苗立枯病						
せんにちこう	斑葉病、茎腐病、立枯病、苗立枯病						
コスモス	そうか病、茎腐病、立枯病、苗立枯病						
ひまわり	べと病、黒斑病、茎腐病、立枯病、苗立枯病						
シネリア	褐斑病、茎腐病、立枯病、苗立枯病						
スイトピー	腰折病、茎腐病、立枯病、苗立枯病						
みやこわすれ アンスリウム	根腐病、茎腐病、立枯病、苗立枯病						
斑入り アマドコロ	斑点病、茎腐病、立枯病、苗立枯病						
ゆきやなぎ	苗立枯病		1000倍	200～700ℓ/10a	—	8回以内	8回以内
芝	葉腐病 (ブラウンパッチ)	300～500倍	1㎡当り 0.5～2ℓ	発病初期			
		500～800倍	1㎡当り 1～2ℓ				
	赤焼病	300～800倍	1～2ℓ				
たばこ	赤星病	800倍	25～180ℓ/10a	収穫10日前まで	2回以内	2回以内	



土壌病害

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 又は使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	キャブタを含む 農薬の 総使用回数
トマト きゅうり なす メロン すいか しろり かぼちゃ	苗立枯病	種子重量の 0.2~0.4%	—	は種時	1回	粉衣	5回以内 (種子粉衣は 1回以内)
		800倍	1 m ² 当り 2ℓ	は種後 2~3葉期	5回以内	ジョウロ又は 噴霧機で 全面散布	
ピーマン		種子重量の 0.2~0.4%	—	は種時	1回	粉衣	2回以内 (種子粉衣は 1回以内)
とうがらし類		800倍	1 m ² 当り 2ℓ	は種後 2~3葉期	2回以内	ジョウロ又は 噴霧機で 全面散布	3回以内 (種子粉衣は 1回以内、は種 後は2回以内)
チューリップ	青かび病	800~1000倍	—	球根掘取時 及び植付時	8回以内	球根浸漬	8回以内
アイリス		400倍		植付前		30分間 球根浸漬	

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	キャブタを含む 農薬の 総使用回数
野菜類 豆類 (種実) 飼料作物 未成熟とうもろこし	ピシウム・リゾクトニア菌 による病害 (苗立枯病等)	種子重量の 0.2~0.4%	—	は種前	1回	種子処理機 による 種子粉衣	1回
花き類・観葉植物							8回以内