



平成 22 年 3 月 4 日

お客様各位

アリスタ ライフサイエンス株式会社  
日本事業本部

## 「オーソサイド<sup>®</sup>水和剤 80」適用拡大のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社化学殺菌剤「オーソサイド<sup>®</sup>水和剤 80（登録番号：第 21292 号）」におきまして、2010 年 3 月 3 日付けで適用拡大となりましたので、ご連絡いたします。適用拡大内容は以下の通りです。変更後の適用病害虫の範囲はおよび使用方法は別紙に示します。

使用者様及びお取扱各位への周知徹底についてご協力を賜りたく何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

### 【変更内容】

- 作物名「葉たまねぎ」に適用病害虫名「灰色かび病、白色疫病、苗立枯病」を追加する。
- 作物名「ししとう」に適用病害虫名「苗立枯病」を追加する。
- 作物名「アイリス」に適用病害虫名「青かび病」を追加する。
- 作物名「たまねぎ」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収穫前日まで」に変更する。
- 作物名「いんげんまめ」の使用時期を「収穫 45 日前まで」から「収穫 30 日前まで」、本剤の使用回数を「1 回」から「2 回以内」及びキャプタンを含む農薬の総使用回数を「1 回」から「3 回以内（種子粉衣は 1 回以内、は種後は 2 回以内）」へ変更する。
- 作物名「ばら」の適用病害虫名「黒点病」を「黒星病」へ変更する。
- 土壌病害の作物名「野菜類（さやいんげんを除く）」及び「豆類（種実、ただし、いんげんまめを除く）」を「野菜類」及び「豆類（種実）」へ変更する。
- 作物名「たばこ」の使用時期を「収穫 10 日前まで」、本剤の使用回数及びキャプタンを含む農薬の総使用回数をそれぞれ「2 回以内」に変更する。

- 作物名「花き類・観葉植物（ばら、りんどう、せんいちこう、コスモス、ひまわり、シネリア、スイトピー、みやこわすれ、アンスリウム、斑入りアマドコロを除く）」「ばら」「りんどう」「せんいちこう」「コスモス」「ひまわり」「シネリア」「スイトピー」「みやこわすれ」「アンスリウム」「斑入りアマドコロ」「ゆきやなぎ」の本剤の使用回数及びキャプタンを含む農薬の総使用回数をそれぞれ「8回以内」に変更する。
- 土壌病害の作物名「花き類・観葉植物」のキャプタンを含む農薬の総使用回数を「8回以内」に変更する。
- 作物名「チューリップ（球根）」及び使用方法「浸漬」を「チューリップ」及び「球根浸漬」に変更し、本剤の使用回数及びキャプタンを含む農薬の総使用回数をそれぞれ「8回以内」に変更する。

【お問い合わせ先】

アリスタ ライフサイエンス株式会社 日本事業本部 (Tel:03-3547-4416)



(別紙)

**■オーソサイド®水和剤 80【変更後の適用病害虫の範囲および使用方法】**

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	キャプタンを含む 農薬の総使用回数
たまねぎ	灰色かび病 白色疫病 苗立枯病	600 倍	収穫前日 まで	5 回以内	散布	6 回以内 (種子粉衣は 1 回以 内、は種後は 5 回以 内)
葉たまねぎ			収穫 7 日 前まで			
いんげんまめ	炭疽病	600～ 1200 倍	収穫 30 日前 まで	2 回以内		3 回以内 (種子粉衣は 1 回以 内、は種後は 2 回以 内)
花き類・観葉植物 (ばら、りんどう、 せんにちこう、コ スモス、ひまわ り、シネラリア、ス イトピー、みやこ わすれ、アンスリ ウム、斑入りアマ ドコロを除く)	茎腐病 立枯病 苗立枯病	600 倍	—	8 回以内		8 回以内
ばら	黒星病	800 倍				
	茎腐病、立枯病 苗立枯病	600 倍				
りんどう	葉枯病、茎腐病、 立枯病、苗立枯病					
せんにちこう	斑葉病、茎腐病、 立枯病、苗立枯病					
コスモス	そうか病、茎腐病、立 枯病、苗立枯病					
ひまわり	べと病、黒斑病、 茎腐病、立枯病、 苗立枯病					
シネラリア	褐斑病、茎腐病、 立枯病、苗立枯病					
スイトピー	腰折病、茎腐病、 立枯病、苗立枯病					
みやこわすれ アンスリウム	根腐病、茎腐病、 立枯病、苗立枯病					
斑入りアマドコロ	斑点病、茎腐病、 立枯病、苗立枯病					
ゆきやなぎ	苗立枯病				1000 倍	
たばこ	赤星病				800 倍	



## 土壌病害

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 又は使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	キャプタンを 含む農薬の 総使用回数
ししとう	苗立枯病	800 倍 (1 m <sup>2</sup> 当り 2ℓ)	は種後 2~3 葉期	2 回以内	ジョウロ又 は噴霧機で 全面散布	3 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、は種 後は 2 回以 内)
アイリス	青かび病	800 倍	植付前	8 回以内	30 分間 球根浸漬	8 回以内
チューリップ		800~ 1000 倍	球根掘取時 及び植付時		球根浸漬	

作物名	適用病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	キャプタンを 含む農薬の 総使用回数
野菜類 豆類 (種実) 花き類・観葉植物	ピシウム・リゾク トニア菌による病害 (苗立枯病等)	種子重量の 0.2~0.4%	は種前	1 回	種子処理機に よる 種子粉衣	1 回 8 回以内